

Piromed 40 G.P.

Piroxicam 40 mg

Antirreumático - Antiinflamatorio - Analgésico

Comprimidos Gastroprotegidos

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido gastroprotegido de PIROMED 40 G.P. contiene:
Piroxicam..... 40 mg
Excipientes..... c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

PIROMED 40 G.P. antiinflamatorio no esteroide con destacada acción analgésica y antipirética, caracterizado además por su rápida absorción gastrointestinal y su vida media plasmática prolongada. Los comprimidos de Piroxicam 40 G.P. liberan el principio activo (**Piroxicam**) recién a nivel del intestino delgado, ya que poseen una recubierta especial resistente a la acción del jugo gástrico. Esta última característica le resta agresividad, haciendo que la mucosa gástrica no se irrite ni se lesione, brindándole seguridad y efectividad al paciente con respecto al producto.

INDICACIONES

PIROMED 40 G.P. está indicado en Artritis reumatoidea Reumatismo extraarticular, Osteoartritis. Bursitis. Sinovitis. Tendinitis. Gota aguda. Dolores post-traumáticos y post-quirúrgicos. Síndrome de hombro doloroso. Contracturas musculares. Lumbociática, etc.

POSOLOGÍA

1 comprimido cada 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad al **Piroxicam**. Diabetes. Mellitus. Úlcera péptica activa. Pacientes a los que el Ácido Acetilsalicílico u otros AINEs provoquen síntomas de asma, poliposis nasal, edema angioneurótico o urticaria.

REACCIONES ADVERSAS

Las más frecuentes son los síntomas gastrointestinales pero en general no interfieren la marcha del tratamiento: náuseas, estomatitis, flatulencia, diarrea, dispepsia. Pueden aparecer raramente efectos sobre el SNC como cefaleas, mareos y somnolencia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La administración de **Piroxicam** debe vigilarse en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal alta. Se deberá tener cuidado en pacientes con volumen circulatorio y riego sanguíneo renal disminuido ya que puede precipitarse una descompensación renal. Deberá tener especial cuidado en pacientes que manejen vehículos o maquinarias

INTERACCIONES

Al asociar con Ácido Acetilsalicílico o administración con otro AINE aumenta la posibilidad de reacciones adversas.

Piroxicam aumenta los niveles plasmáticos estables del Litio e incrementa ligeramente su absorción cuando se administra junto con Cimetidina. La asociación con Ácido Acetilsalicílico produce una disminución en los niveles plasmáticos de **Piroxicam** de hasta 80 % de los valores normales.

SOBREDOSIS

Se observan síntomas como: dolor abdominal, náuseas, vómitos, somnolencia, letargo.

TRATAMIENTO

Vaciado del estómago mediante inducción de la emesis, vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales, tratamiento sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y Lactancia: Debido a que la administración de medicamentos del tipo de **Piroxicam** se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.

En el tercer trimestre la administración de **Piroxicam** esta contraindicada. Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo del **Piroxicam** se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

Este medicamento puede pasar en pequeña cantidad a la leche materna, por lo que no se recomienda su uso durante el periodo de lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 12 comprimidos gastroprotegidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535