

Piromed Relax

Piroxicam - Paracetamol

Carisoprodol

Comprimidos

Analgésico - Antiinflamatorio con acción
miorrelajante



Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:

Piroxicam..... 10 mg

Paracetamol..... 400 mg

Carisoprodol..... 300 mg

Excipiente: Alcohol Etilico 0,08 mL; Color Amarillo FDC N° 5 Lake 5 mg;

Otros Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

PIROMED RELAX es un analgésico con acción antiinflamatoria y relajante muscular. En esta asociación el **Paracetamol** potencia el efecto analgésico del **Piroxicam**, aliviando rápidamente el dolor y reduciendo a la vez la inflamación de los cuadros inflamatorios osteoarticulares y de sus anexos, y relajando simultáneamente la contractura muscular que frecuentemente se asocia a estos cuadros, debiéndose este efecto a la acción miorrelajante central del **Carisoprodol**.

INDICACIONES

Enfermedades traumáticas: Fracturas, Contusiones, Luxaciones, Esguinces, Distensión y ruptura muscular. Contractura muscular. Torticolis, Síndrome de hombro doloroso. Bursitis. Tenosinovitis y Fibrositis.

Enfermedades reumáticas: Artritis reumatoides, Artrosis, Espondiloartritis, Dolores musculares producidos por ejercicios violentos. Post cirugía ortopédica y traumatología.

POSOLOGÍA

Dosis habitual: 1 comprimido cada 12 horas. El tratamiento puede ser iniciado con 2 comprimidos en una sola toma y luego continuando con 1 comprimido cada 12 horas. **En casos severos:** 2 comprimidos cada 12 horas.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"

REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, irritación gastrointestinal, cansancio o debilidad no habituales, somnolencia, constipación y confusión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe cuidarse el uso en pacientes alérgicos a la Aspirina ya que puede producir reacciones alérgicas tipo broncoespasmo. Además, en pacientes con problemas renales o hepáticos se aconseja ajustar la dosificación. Se debe evitar realizar tareas peligrosas, operar máquinas o conducir. No se recomienda el consumo de alcohol y el uso de otros AINES, ya que pueden aumentar los efectos secundarios gastrointestinales. Se recomienda precaución en los pacientes geriátricos ya que pueden ser más propensos a desarrollar efectos adversos hepáticos.

Este medicamento contiene como excipiente 0,10 g de Alcohol Etilico por cada comprimido, lo que puede ser causa de riesgo en niños.

Contiene además como excipiente Color Amarillo FDC N° 5 Lake por cada comprimido, que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad comprobada a alguno de sus componentes en la formulación.

Enfermedad hepática. Alcoholismo. Difunción renal. Embarazo. Lactacia. Miastenia gravis.

INTERACCIONES

El **Piroxicam** al administrarse con el Ácido Acetilsalicílico aumenta la posibilidad de reacciones adversas y disminuye los niveles plasmáticos del **Piroxicam**.

El **Piroxicam** aumenta los niveles plasmáticos de Lito.

El **Paracetamol** aumenta el efecto anticoagulante de los derivados de Cumarina.

El **Carisoprodol** y los psicotrópicos pueden producir efecto sinérgico.

SOBREDOSIS

Diarreas, mareos y vómitos. Dolor de estómago. Lesión hepática y renal.

TRATAMIENTO

Lavado gástrico. Controlar la función hepática. Instaurar el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico. Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes que presenten sensibilidad a las drogas. Alcoholismo. Úlcera péptica activa. Insuficiencia hepática y renal. Embarazo y lactancia. Debe suspenderse su uso si se produce hemorragia o ulceración gastrointestinal.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta bajo receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535