

Restrol 250

Resveratrol 250 mg

Cápsulas

V.a.: Oral

INDICACIONES

Antioxidante. Prevención terciaria del cáncer. Prevención primaria factores de riesgo asociados a los problemas cardiovasculares y de la demencia causada por la enfermedad de Alzheimer.

POSOLOGÍA

Adultos: 1 a 3 cápsulas diarias, 30 minutos antes de las principales comidas. Dosis máxima diaria: 1000 mg.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo. Lactancia. Hipersensibilidad al Resveratrol. Mujeres en periodo menstrual. Productos con estrógeno.

REACCIONES ADVERSAS

El ardor y dolor de estómago, diarrea y fatiga, posibles sangrados en pacientes con problemas de la circulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Utilizar con precaución en pacientes con hemofilia. No se aconseja consumir el Resveratrol junto con leche, ya que este lácteo impide su adecuada absorción. Este medicamento contiene Lactosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

INTERACCIONES

El Resveratrol puede tener efectos aditivos cuando se toma con antifúngicos tales como la Nistatina, drogas cardiovasculares/antihipertensivas.

- Puede haber un efecto protector del Resveratrol sobre la toxicidad del riñón, producido por la Gentamicina.
- El uso de Resveratrol con otras drogas antiplaquetarias como el Clopidogrel, Dipyridamol, Antiinflamatorios no esteroideos y Aspirina o drogas anticoagulantes como la Warfarina, puede causar incremento en el riesgo de hemorragia.
- El Resveratrol puede incrementar los efectos de algunos antivirales.
- La ingesta de Resveratrol con una comida con alto contenido de grasas reduce la cantidad de Resveratrol absorbido por el cuerpo.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO

Dosis excesiva de Resveratrol puede producir calambres abdominales, dolor en las articulaciones, anemia y hormigueo de la mano. El tratamiento deberá ser sintomático y de sostén.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 60 cápsulas

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".

 **INDUFAR**CISA

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:
INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13