

SEPTOPRIM FORTE

Trimetoprim - Sulfametoxazol

Comprimidos doble concentración

Quimioterápico, bactericida de amplio espectro

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido SEPTOPRIM FORTE contiene:

Trimetoprim.....	160 mg
Sulfametoxazol.....	800 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

SEPTOPRIM está elaborado a base de **Trimetoprim** y **Sulfametoxazol**, los cuales actúan por separado aunque de manera simultánea, en pasos sucesivos del metabolismo bacteriano. Se impide así, la elaboración de ADN y ARN, elementos de vital importancia para la célula bacteriana, determinando la muerte del microorganismo.

SEPTOPRIM FORTE comprimidos posee doble concentración de sus componentes en relación a los preparados comunes que contienen esta asociación.

INDICACIONES

Infecciones respiratorias superiores e inferiores. Infecciones gastrointestinales.

Tratamiento de la bronquitis y exacerbaciones agudas de bronquitis crónica en adultos, causada por H. influenzae o Streptococcus pneumoniae. Otitis media aguda en niños causada por H. influenzae o S. Pneumoniae.

Infecciones bacterianas del tracto urinario causadas por E. coli, especies de Klebsiella, Enterobacter, P. mirabilis, P. vulgaris y Morganella morganii.

POSOLOGÍA

Adultos y niños mayores de 12 años: Administrar 1 comprimido por vía oral cada 12 horas. La posología será modificada de acuerdo al mejor criterio médico.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en lactantes ya que puede producirles kernicterus. La relación riesgo beneficio se evaluará en pacientes con disfunción hepática o renal, porfiria y deficiencias de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa.

REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia mas frecuente: fotosensibilidad, rash cutáneo y prurito. En raras ocasiones: dolor articular y muscular, fiebre, hemorragias o hematomas no habituales, cansancio o debilidad no habituales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Deberá mantenerse una ingestión adecuada de líquidos. Es importante no omitir las dosis y completar el ciclo del tratamiento. Los efectos neutropénicos del **Trimetoprim** pueden dar lugar a mayor incidencia de infecciones microbianas, retraso en la cicatrización y hemorragia gingival. Aunque el fármaco está indicado en el tratamiento de otitis media en niños no deberá prescribirse para la profilaxis o el tratamiento prolongado.

INTERACCIONES

El uso simultáneo con Rifampicina puede aumentar la eliminación y disminuir la vida media del **Sulfametoxazol** más **Trimetoprim**. Agentes depresores de la médula ósea pueden aumentar los efectos leucopénicos o trombocitopénicos.

Los medicamentos fotosensibilizadores pueden producir efectos aditivos de fotosensibilidad al usarse de manera concomitante. El Probenecid disminuye la secreción tubular renal de las sulfamidas, dando lugar a concentraciones séricas totales mayores y más prolongadas.

SOBREDOSIS

Cefalea, mareos, diarrea, anorexia, náusea y vómitos.

TRATAMIENTO

Es sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

En pacientes con hipersensibilidad comprobada a las Sulfamidas. Embarazo. Afecciones graves del parénquima hepático.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 18 comprimidos de SEPTOPRIM FORTE.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



**LABORATORIOS
INDUFAR
División de INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13