

# TIOTAL

## Fenazopiridina 200 mg

### Uroanalgésico

#### Comprimidos Revestidos

Vía de Administración: Oral

#### FÓRMULA

Cada comprimido revestido de TIOTAL contiene:  
Fenazopiridina Clorhidrato.....200 mg  
Excipientes.....c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

TIOTAL comprimidos está elaborado a base de un azo-colorante que tiene acción analgésica y antiséptica sobre el tracto urinario específicamente. Elimina así los dolorosos y molestos síntomas que se presentan en la fase aguda de las infecciones urinarias, sirviendo como coadyuvante del tratamiento antibacteriano.

#### INDICACIONES

Tratamiento sintomático en infecciones urinarias en las que hay componentes dolorosos. Disuria. Polaquiuria, ardor y urgencia miccional.

#### POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico, se sugiere: 1 comprimido de TIOTAL cada 8 horas.

#### REACCIONES ADVERSAS

En algunos pacientes pueden presentarse molestias gastro-intestinales. Se debe tener mucho cuidado con la sobredosis, la cual puede provocar metahemoglobinemia.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La **Fenazopiridina** colorea de anaranjado rojizo la orina y puede teñir la ropa. Tomar con alimentos o después de haberlos ingerido para reducir las molestias gástricas. La coloración de la piel puede indicar acumulación del fármaco.

#### CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia hepática o renal. Glomerulonefritis. Uremia.

#### INTERACCIONES

La presente formulación no presenta interacciones significativas con otros fármacos.

#### SOBREDOSIS

Metahemoglobinemia, anemia hemolítica, calambres o dolor de estómago, indigestión, mareos, dolor de cabeza.

#### TRATAMIENTO

Administrar Azul de Metileno o Ácido Ascórbico para el tratamiento de la metahemoglobinemia. Tratamiento sintomático o de mantenimiento.

#### RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar durante el embarazo, lactancia, hepatitis y disfunción renal.

#### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a una temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

#### PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.  
Teléfono: 220-418"



**LABORATORIOS  
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13