

TRICOVAL

Metronidazol 500 mg/100 mL

Solución Inyectable

Quimioterápico - Anaeróbica

Vía de Administración: Inyectable IV

FÓRMULA

Cada frasco infusor de 100 mL contiene:

Metronidazol..... 500 mg
Excipientes..... c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

TRICOVAL INYECTABLE es un bactericida que actúa eficazmente en afecciones producidas por anaerobios, cualquiera sea su localización.

INDICACIONES

Profilaxis y tratamiento de infecciones bacterianas por anaerobios de cualquier localización, sea de cabeza, tronco, tracto gastrointestinal, tracto urogenital masculino y femenino. Septicemias y bacteriemias. Pre y post operatorio de cirugía en cavidad abdomino-pelvíana. Infecciones por gérmenes sensibles: bacteroides, clostridium, actinomyces, cocos grampositivos. Helmintiasis. Amebiasis. Tricomoniasis.

POSOLOGÍA

Adultos: Se recomienda la administración de un frasco infusor de TRICOVAL INYECTABLE por vía intravenosa cada 8 horas, con un ritmo de 5 mL por minuto, durante 7 días.

Dosis máxima: 4 gr/día.


TRICOVAL INYECTABLE es compatible para su administración con solución fisiológica o glucosada.

Profilaxis: Iniciar dos días antes de la cirugía, 1 frasco ampolla cada 8 horas.

Niños menores de 12 años: 7,5 mg/kg. (1,5 mL, cada 8 horas)


Niños mayores de 12 años: 500 mg, por perfusión intravenosa, a razón de 5 mL por minuto, cada 8 horas.

MODO DE INSTALAR EL EQUIPO MACROGOTERO



Forma Correcta:

Introducir la aguja dentro de la aureola central



Forma Incorrecta:

Introducir la aguja fuera de la aureola central

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. La asociación con Disulfiram puede producir estados delirantes o confusionales. No asociar con anticoagulantes. Administrar con cuidado en la insuficiencia hepática severa.

REACCIONES ADVERSAS

Trastornos neurológicos (cefaleas, vértigo, insomnio, alucinaciones), gastrointestinales, hematológicos (rash cutáneo, prurito), tromboflebitis.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad. Afecciones del sistema nervioso. Discrasias sanguíneas. Insuficiencia hepática. Embarazo. Lactancia.

INTERACCIONES

No se recomienda el uso simultáneo con alcohol, porque puede producir acumulación de acetaldehído por interferencia con la oxidación del alcohol y dar lugar a calambres abdominales, náuseas, vómitos y cefaleas.

Los anticoagulantes potenciarían su efecto, debido a la inhibición del metabolismo enzimático de los anticoagulantes.

El uso simultáneo con Disulfiram debe evitarse porque puede producir confusión y reacciones psicóticas.

SOBREDOSIS

Mareos o sensación de mareo, dolor de cabeza, orina oscura, dolor grave en la espalda.

TRATAMIENTO

El tratamiento para la sobredosis de **Metronidazol** debe ser sintomático y de apoyo.

REACCIONES DE USO

Pacientes con sensibilidad a la droga. Insuficiencia hepática. Embarazo y lactancia. Antecedentes de discrasias sanguíneas, enfermedad orgánica activa del S.N.C.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admisible entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Cajas conteniendo 1 frasco infusor x 100 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada
Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13