

# Tauromizol

## Ranitidina

**Comprimidos Revestidos 150 - 300 mg**

Vía de Administración: Oral

**Solución Inyectable 50 mg/5 mL**

Vía de Administración: Inyectable IM-IV

**Antiulceroso**

### FÓRMULA

Cada comprimido revestido de **TAUROMIZOL 150** contiene:

Ranitidina (como clorhidrato).....150 mg  
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido revestido de **TAUROMIZOL 300** contiene:

Ranitidina (como clorhidrato).....300 mg  
Excipientes.....c.s.

Cada ampolla de **TAUROMIZOL SOLUCION INYECTABLE** contiene:

Ranitidina (como clorhidrato).....50 mg  
Excipientes c.s.p.....5 mL

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiulceroso. Antagonista de los receptores H2 de la histamina.

### MECANISMO DE ACCIÓN

Antagonista del receptor de la histamina, de 5 a 12 veces más potente que la Cimetidina y con menor afinidad por el sistema microsomal hepático. Inhibe de forma competitiva y selectiva la unión de la histamina con el receptor H2 de la célula parietal gástrica. No altera la motilidad gástrica, ni la secreción biliar y pancreática. A dosis ENDOVENOSA elevada aumenta los niveles de prolactina e inhibe la secreción de vasopresina.

### INDICACIONES

Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. Síndrome de Zollinger-Edison. Tratamiento de hemorragias esofágicas y gástricas con hipersecreción y profilaxis de la hemorragia recurrente en pacientes con úlcera sangrante.

### POSOLOGÍA

La dosis usual en adultos es de 150 mg por vía oral 2 veces por día o una dosis única de 300 mg por la noche. Esta posología se mantendrá durante 4 a 6 semanas; pero puede suspenderse antes si el tratamiento fué efectivo.

**Úlcera gastroduodenal:** Tauromizol 150 mg vía oral cada 12 horas o 300 mg en una sola toma por la noche; durante 4 - 6 semanas.

**Reflujo gastroesofágico:** Tauromizol 150 mg vía oral cada 6 - 12 horas.

**Síndrome de Zollinger - Ellison:** Tauromizol 150 mg vía oral cada 8 - 12 horas, si es necesario se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 900 mg/día, o 50 mg IV lenta (más de 1 minuto) cada 6 - 8 horas.

**Profilaxis de úlceras de estrés en pacientes críticos:** Tauromizol 50 mg IV lenta cada 6 - 8 horas; o 150 mg diluidos en 250 ml de solución fisiológica en perfusión IV continua a dosis de 6,25 mg/hora; cada 6 - 8 horas.

**Síndrome de Mendelson:** como profilaxis de este cuadro se aconseja una dosis oral de 150 mg, 2 horas antes de la anestesia general.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga. Embarazo. Lactancia. En caso de insuficiencia renal, las dosis deberán ser adaptadas al clearance de creatinina existente. Se evaluará la relación riesgo-beneficio en pacientes con disfunción hepática o renal.

### REACCIONES ADVERSAS

Son poco frecuentes y leves: cefalea, vértigo, diarrea, constipación, erupción cutánea, bradicardia o taquicardia (IV), elevación moderada de las transaminasas. Rara vez leucopenia, reacción anafiláctica.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No debe ser utilizado para corregir dispepsias, gastritis ni molestias menores. se debe tener precaución en pacientes con enfermedad hepática preexistente. En general la suspensión del tratamiento en úlcera duodenal recurrente, reactiva el proceso ulceroso. Para evitar estas recidivas se recomienda tras el tratamiento inicial instaurar una terapéutica de mantenimiento de 150 mg/día al acostarse hasta que la posibilidad de recaída sea nula.

- Evitar el consumo de alimentos, bebidas y otros medicamentos que pueden provocar irritación gastrointestinal. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

### INTERACCIONES

A dosis altas puede interferir en el metabolismo de fármacos que utilizan metabolismo microsomal. La Teofilina, Procinamida necesitan ajuste de dosis. La Propantelina aumenta su biodisponibilidad en un 23 % cuando se administra por vía oral. No utilizar conjuntamente con Ketoconazol (requiere medio ácido). Aumenta la biodisponibilidad y el efecto de la Nifedipina, benzodiazepinas, alfa bloqueantes, calcioantagonistas y opiáceos.

### SOBREDOSIS

Se procede al lavado gástrico y tratamiento sintomático de las arritmias. Se elimina por hemodiálisis.

### TRATAMIENTO

En general es sintomático y de mantenimiento con posible utilización de los siguientes procedimientos: Para crisis convulsivas: Tratamiento con Diazepam intravenoso. Inducción de emesis y/o utilización de lavado gástrico.

### RESTRICCIONES DE USO

En pacientes alérgicos a la **Ranitidina**. Pacientes con enfermedad hepática preexistente. Embarazo y lactancia.

### CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

### PRESENTACIONES

Caja conteniendo 20 comprimidos revestidos de **Tauromizol 150 mg**

Caja conteniendo 30 comprimidos revestidos de **Tauromizol 150 mg**.

Caja conteniendo 30 comprimidos revestidos de **Tauromizol 300 mg**.

Caja conteniendo 5 ampollas de **Tauromizol Solución Inyectable**.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.  
Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535