

URO-SEPTOPRIM

Trimetoprim - Sulfametoxazol - Fenazopiridina

Comprimidos

Quimioterápico bactericida de amplio espectro y analgésico de las vías urinarias

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido blanco contiene:

Trimetoprim.....	160 mg
Sulfametoxazol.....	800 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada comprimido amarillo contiene:

Fenazopiridina Clorhidrato.....	200 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

URO-SEPTOPRIM asocia la potente acción bactericida del **SEPTOPRIM** con la marcada propiedad analgésica de la **Fenazopiridina**, constituyéndose este producto para el tratamiento específico de infecciones urinarias con componente doloroso.

INDICACIONES

Infecciones urinarias acompañadas de disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Pielitis. Pielonefritis. Prostatitis. Cistitis aguda y crónica.

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico:

A la mañana: 1 comprimido blanco + 1 comprimido amarillo

A la noche: 1 comprimido blanco + 1 comprimido amarillo

REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia más frecuente: fotosensibilidad, rash cutáneo y prurito. En raras ocasiones: dolor articular y muscular, fiebre, hemorragias o hematomas no habituales, cansancio o debilidad no habituales. Requerirán atención médica de persistir, los siguientes signos y síntomas: cefalea, mareos, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Deberá mantenerse una ingestión adecuada de líquidos. Es importante no omitir las dosis y completar el ciclo del tratamiento. Una coloración amarillenta en la piel puede indicar acumulación del fármaco. La **Fenazopiridina** colorea de anaranjado-rojizo la orina y puede teñir la ropa. Los pacientes geriátricos pueden correr mayor riesgo de efectos secundarios graves con **Sulfametoxazol** y **Trimetoprim**.

CONTRAINDICACIONES

Afecciones del parénquima hepático. Discrasias sanguíneas. Insuficiencia renal severa. Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Embarazo.

INTERACCIONES

El uso simultáneo con Rifampicina puede aumentar la eliminación y disminuir la vida media del **Sulfametoxazol** + **Trimetoprim**.

El uso simultáneo de depresores de la médula ósea con sulfamidas puede aumentar los efectos leucopénicos o trombocitopénicos.

Los medicamentos fotosensibilizadores pueden producir efectos aditivos al usarse de manera concomitante con sulfamidas.

El Probenecid disminuye la secreción tubular renal de las sulfamidas, dando lugar a concentraciones séricas totales mayores y más prolongadas.

SOBREDOSIS

Cefaleas, mareos, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrarse en pacientes con porfiria y deficiencias de glucosa -6 - Fosfato deshidrogenasa.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admisible entre 15°C y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 12 comprimidos blancos y 12 comprimidos amarillos.

Manténgase Fuera Del Alcance De Los Niños

Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada

Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535