

# Ultrason Neomicina

Crema

**Antibiótico de amplio espectro - Antiinflamatorio**

Vía de Administración: Tópica

## FÓRMULA

Cada gramo de ULTRASON NEOMICINA crema contiene:  
Betametasona (como 17-Valerato).....1 mg  
Neomicina (como Sulfato).....3,5 mg  
Excipientes.....c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

ULTRASON NEOMICINA, gracias a la **Betametasona** ejerce acción antiinflamatoria, antiprurítica y antialérgica. La misma es acelerada por la presencia de la **Neomicina**, de acción bactericida. De esta manera, se logra una buena penetración de ambos principios activos en la piel inflamada e infectada.

## INDICACIONES

Dermatosis inflamatorias con infecciones secundarias. Prurito. Líquen plano. Neurodermatosis. Intertrigo. Dermatitis seborreica. Para tratar la alergia, inflamación y prurito de la piel en la que haya infección bacteriana.

## POSOLOGÍA

Aplicar una delgada capa en las zonas afectadas, 2 a 3 veces al día, frotando con suavidad, para facilitar la absorción en la piel.

## REACCIONES ADVERSAS

Picazón en la zona de aplicación, enrojecimiento, prurito, sequedad, foliculitis, erupciones acneiformes.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse en zonas extensas, en grandes cantidades ni durante períodos prolongados, en pacientes embarazadas o que proyecten quedarse embarazadas. No aplicarse en las mamas antes de amamantar. Evitar su aplicación a pacientes con heridas profundas, quemaduras graves y zonas en carne viva.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a la drogas presentes en la formulación. Tuberculosis cutánea. Lesiones de sífilis, varicela y vacunas. Pacientes con atrofia cutánea pre-existentes.

## INTERACCIONES

Al administrar con fármacos sistémicos nefrotóxicos, puede producirse nefrotoxicidad en especial si existe disfunción renal.

## SOBREDOSIS

Hinchazón, enrojecimiento, escozor.

## TRATAMIENTO

Sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

## RESTRICCIONES DE USO

No es aconsejable el uso de este medicamento en mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

## PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 20 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

**"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535