

VINIL

Comprimidos Gastroprotegidos

VINIL 75

Comprimidos Gastroprotegidos

VINIL RETARD

Comprimidos Revestidos de Acción Sostenida

Diclofenac Potásico

Antiinflamatorio - Analgésico

V.a.: Oral

FÓRMULAS

Cada comprimido gastroprotegido de **VINIL** contiene:

Diclofenac potásico.....50 mg
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido gastroprotegido de **VINIL 75** contiene:

Diclofenac potásico.....75 mg
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido revestido de acción sostenida de **VINIL RETARD** contiene:

Diclofenac potásico.....100 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

VINIL es un antiinflamatorio no esteroide, sintético, moderno y eficaz, procedente del grupo de los arilcanoicos.

VINIL se ha revelado como fármaco de elección para aliviar el dolor correspondiente a las estructuras somáticas, en especial debido a los procesos reumáticos. Es reconocida además, su actividad antiflogística en los procesos reumáticos crónicos, en los que no solamente calma el dolor, sino también disminuye la tumefacción y rigidez articular. Con **VINIL** se obtiene rápida acción analgésica-antiinflamatoria (niveles terapéuticos calmos, a los 30 minutos de su ingestión) a concentraciones comparativamente menores con respecto a otros productos similares conocidos.

INDICACIONES

Contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas, bursitis, tendinitis, tenosinovitis, lumbalgias, laringitis, faringitis, amigdalitis, otitis, artritis reumatoidea, artrosis, espondilitis.

POSOLOGÍA

Adultos:

La dosis usual, salvo mejor criterio médico, es de 50 a 150 mg distribuidos en 2-3 tomas diarias.

Los comprimidos deben ser deglutidos enteros o con la ayuda de un poco de líquido, preferentemente ingerido antes de las comidas.

VINIL COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS

Salvo mejor criterio médico, se sugiere tomar 1 comprimido G.P. de **VINIL**, 2-3 veces al día.

VINIL 75 COMPRIMIDOS GASTROPROTEGIDOS

En caso leve y para tratamiento prolongado: 1 comprimido G.P. de **VINIL 75** al día. En caso necesario la dosis diaria puede aumentarse a 150 mg al día.

VINIL RETARD COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Salvo mejor criterio médico, la dosis recomendada es de 1 comprimido revestido al día.

Niños:

No debe ser utilizado en niños debido a la cantidad de sustancia activa que contienen los preparados.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo, lactancia, úlcera gastrointestinal, hipersensibilidad conocida a la droga, casos de diarrea, insuficiencia cardíaca, renal grave, hepática grave.

REACCIONES ADVERSAS

Con la dosis usual no aparecen. En algunos pacientes se puede presentar, náuseas, diarrea o constipación intestinal, cefalea y/o vértigo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En pacientes alérgicos al Diclofenac. En pacientes sometidos a tratamiento prolongado se deberán realizar recuentos hemáticos periódicos y controlar la función hepática y renal. Especial precaución en pacientes de edad avanzada, disminuyendo la dosis en ancianos débiles o de bajo peso y en los que están con tratamiento diurético. Administrar con precaución en pacientes que presentan infecciones, pues pueden enmascarar síntomas como fiebre y la inflamación.

INTERACCIONES

Administrado en forma simultánea con preparados de Litio o Digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. El peligro de hemorragias aumenta durante el empleo combinado de Diclofenac y anticoagulantes. Puede aumentar la concentración sanguínea del Metotrexato y elevar su toxicidad. La nefrototoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroideos del Diclofenac sobre las Prostaglandinas renales.

SOBREDOSIS

- Disturbios del SNC (vértigo, cefalea, hipertensión)
- Náuseas y vómitos
- Dolor abdominal
- Sangrado

TRATAMIENTO

- Lavado gástrico y tratamiento con carbón activado
- Tratamiento sintomático y de soporte

RESTRICCIONES DE USO

En pacientes con factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hábito tabáquico), se debe utilizar con precaución después de considerar detalladamente el balance entre beneficios esperados y el riesgo particular de cada paciente. Evaluar relación riesgo/beneficio en pacientes con trastornos hemorrágicos, pacientes a quienes el Ácido acetilsalicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandina sintetasa desencadenen ataques de asma, urticaria o rinitis aguda.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 20 comprimidos gastroprotegidos de **VINIL**.

Caja conteniendo 20 comprimidos gastroprotegidos de **VINIL 75**.

Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos de acción sostenida de **VINIL RETARD**.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta bajo receta

“En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418”.



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13