

Vinil Forte

Diclofenac Potásico - Fosfato de Codeína

Comprimidos Revestidos

Analgésico - Antiinflamatorio

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Diclofenac potásico.....	50 mg
Fosfato de codeína.....	50 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

VINIL FORTE es la combinación de **Diclofenac potásico**, un analgésico y antiinflamatorio de efecto periférico bastante efectivo, con **Fosfato de Codeína**, un analgésico de efecto central. El **Diclofenac** ejerce su acción antiinflamatoria al actuar periféricamente en el tejido inflamado, reduciendo la actividad de las prostaglandinas en estos tejidos, por inhibición de la síntesis o de las acciones de otros mediadores locales de la respuesta inflamatoria. Su acción analgésica ejerce el **Diclofenac** al bloquear el impulso doloroso mediante una reducción de la actividad de las prostaglandinas y la inhibición de la síntesis o de las acciones de otras sustancias que sensibilizan los receptores del dolor a los estímulos mecánicos o químicos. El **Fosfato de Codeína** inhibe las vías de dolor en distintos planos del SNC mediante la inhibición de la liberación de neurotransmisores y la activación de vías inhibitorias. Los analgésicos opioides se unen en forma estereoespecífica a receptores opioides en varios sitios del SNC alterando el proceso que afecta la percepción y la respuesta emocional al dolor, debido a su metabolización parcial en morfina.

INDICACIONES

VINIL FORTE está indicado en el tratamiento sintomático de los procesos inflamatorios acompañados de cuadros de dolor intenso en pacientes con procesos neoplásicos, especialmente en el caso de afectación esquelética, dolores asociados a edemas asociados a tumores, dolores oncológicos, dolores post-quirúrgicos, politraumatismos.

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico:

Adultos: 1 comprimido revestido tres veces al día. El intervalo entre tomas no debe ser menor de 8 horas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la formulación. Úlcera gástrica o duodenal en actividad. Hemorragia intestinal. Melena. Antecedentes de reacciones cutáneas, crisis asmáticas o rinitis desencadenadas por la administración del Ácido Acetilsalicílico u otros AINEs. Uso durante el embarazo y en el parto. Uso en niños. Insuficiencia respiratoria, crisis asmática. Pacientes en coma. Pacientes con discrasias sanguíneas.

REACCIONES ADVERSAS

A las dosis terapéuticas recomendadas, es bien tolerado. Pueden presentarse: náuseas, vómitos, constipación, diarrea y hemorragias gastrointestinales. Somnolencia y cefalea. También flatulencia, dispepsia, dolor estomacal, anorexia y úlceras gástricas o intestinales. Reacciones de hipersensibilidad. Daño hepático, hepatitis con o sin ictericia. Trombocitopenia, agranulocitosis, leucopenia, anemia hemolítica y aplásica. Edema periférico, en pacientes con alteración de la función renal o hipotensión arterial. Aisladamente pueden presentarse: estomatitis, glositis, lesiones esofágicas, estenosis intestinales membranosas. Ecema, eritema, reacciones cutáneas. Hepatitis fulminante y pancreatitis. Alteraciones de la sensibilidad. Trastornos visuales, alteración del gusto. Aumento o disminución del peso corporal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe ser utilizado con precaución, en pacientes con afecciones hemorrágicas, tratados con antiagregantes plaquetarios y bajo tratamiento anticoagulante. Administrar con precaución en pacientes con función renal o cardíaca disminuida, tratados con diuréticos o sometidos a cirugía mayor. La administración de dosis elevadas de VINIL FORTE deberá ser estrictamente valorada en pacientes con hipotensión por hipovolemia. Por contener **Codeína**, existe el riesgo de crear dependencia.

El tratamiento con **Diclofenac** puede enmascarar los síntomas de un proceso infeccioso. La aparición de efectos adversos es más frecuente en pacientes añosos. La **Codeína** presenta tolerancia cruzada con otros opioides, y asociada a sedantes centrales o alcohol aumenta la sedación y depresión respiratoria. El uso de **Codeína** puede llegar a disminuir la atención o la capacidad de reacción rápida, como manejo de automotores o maquinarias.

INTERACCIONES

La administración concomitante de **Codeína** con depresores del SNC como ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y alcohol pueden incrementar los efectos depresores sobre el SNC. Los efectos gastrointestinales de los opioides pueden retrasar la absorción de la Mexiletina, y contrarrestar los efectos de la Cisaprida, Metoclopramida y Domperidona. La **Codeína** junto con el alcohol disminuye la capacidad psicomotora.

La ingestión después de la comida puede conducir a una absorción retardada.

SOBREDOSIS

Los síntomas posibles de una sobredosificación son: disturbios de SNC (mareo, vértigo, cefalea, alucinaciones), náuseas y vómitos, dolor abdominal, sangrado, somnolencia, sequedad de boca, nariz y faringe, dificultad respiratoria, enrojecimiento facial, erupción cutánea, prurito, aumento de la presión arterial, extrasístoles y excitación, miosis, hipotensión o hipertensión, insuficiencia circulatoria y coma profundo.

TRATAMIENTO

Tratamiento sintomático y de soporte, con posible utilización de jarabe de Ipecacuana para la inducción de emesis. En caso de estar imposibilitada la emesis, administración de carbón activado, lavado gástrico, no más de tres horas luego de la ingestión. La Naloxona es el antagonista narcótico específico para los opioides, incluida la Codeína, que debe ser administrado solamente en caso de depresión cardiovascular o respiratoria clínicamente significativa.

RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en el embarazo así como en el momento del nacimiento. La administración de VINIL FORTE solo deberá efectuarse tras una estricta evaluación de la relación riesgo-beneficio en pacientes con porfirias inducidas, lupus eritematoso sistémico, collagenosis mixtas, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, durante la lactancia, en pacientes con dependencia de opioides, trastornos de conciencia, compresión cerebral y trastornos de la función respiratoria o del centro respiratorio.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada



"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de INDUFAR CISA
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13