

Vinil Diclofenac 1mg/mL

Solución oftálmica estéril
Antiinflamatorio Oftálmico
Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Diclofenac sódico..... 1 mg
Excipientes: Ácido Bórico 19 mg; Cloruro de Benzalconio 0,10 mg; Otros Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Contiene **Diclofenac** sódico, un antiinflamatorio no esteroideo derivado del Ácido fenilacético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y otros mediadores del proceso inflamatorio a nivel del humor acuoso, iris, cuerpo ciliar y conjuntiva, antagonizando la inflamación, vasodilatación, dolor y prurito que se producen en estos casos. Su acción tópica no aumenta el riesgo de infección ocular y su absorción sistémica es nula o escasa.

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de inflamaciones oculares, no asociadas a infecciones como: inflamación post-operatoria de cataratas y otras cirugías, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, escleritis, úlceras de córnea, traumatismos de córnea y conjuntiva, heridas penetrantes y no penetrantes. Elimina rápida y eficazmente el dolor por procesos inflamatorios. Reduce el dolor, la fotofobia y la sensación de quemazón/ escozor en el post-operatorio de cirugía refractiva para el tratamiento de miopía.

POSOLOGÍA

Vía de administración: Oftálmica

Antiinflamatorio y analgésico ocular: conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlcera de córnea, inflamaciones posttraumáticas, 1 gota en el ojo afectado 4 a 5 veces al día durante 1 a 2 semanas según gravedad.

Preoperatorio: 1 gota en el ojo afectado hasta 5 veces repartidas dentro de las tres horas antes de la operación.

Post-operatorio: 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día comenzando 24 horas después de la cirugía y continuando durante el tiempo necesario. Lavarse siempre las manos antes y después de su aplicación. Quitarse los lentes de contacto.

Inclinarse la cabeza levemente hacia atrás y llevar el párpado inferior hacia abajo con su dedo índice para formar una bolsa e instilar la cantidad de gotas indicadas. Cerrar el ojo suavemente por uno o dos minutos y oprimir delicadamente el lado interno del ojo con la punta de sus dedos, para evitar que el medicamento se escape hacia afuera. No frotar los ojos. No enjuagar el gotero. Cerrar bien el frasco inmediatamente después de utilizarlo. Cuidar que la superficie del frasco no entre en contacto con el ojo, las yemas de los dedos o cualquier otra superficie.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al **Diclofenac**. Pacientes que han presentado ataque de asma, urticaria o rinitis aguda con Ácido acetilsalicílico o similares.

REACCIONES ADVERSAS

Con la dosis usual no aparecen. En algunos pacientes se puede presentar ardor ligero y transitorio.

Raramente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad con prurito (pico), enrojecimiento y fotosensibilidad (sensibilidad a la luz).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Pacientes que usan lentes de contacto deben quitárselos para la aplicación y

colocárselos nuevamente 15 minutos después. Puede retardar el tiempo de sangrado en cirugía. Puede enmascarar una infección ocular aguda el uso tópico de medicamentos antiinflamatorios. En caso de riesgo de infección puede ser aplicado conjuntamente con antibióticos. Por contener Ácido Bórico como excipiente esta contraindicado en niños menores de tres años. Este medicamento por contener Cloruro de Benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas.

Embarazo y Lactancia: Estudios de toxicidad llevados a cabo en animales no han revelado evidencias de un riesgo para el feto, sin embargo no existen estudios controlados en mujeres embarazadas.

Conducción y uso de máquinas: puede producir molestias visuales después de la instilación, si ocurren, no conducir o utilizar maquinaria peligrosa hasta que se recupere la visión normal.

No exceda la dosis indicada, si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su oftalmólogo.

INTERACCIONES

Aplicado tópicamente no se conocen interacciones medicamentosas. En caso de necesidad puede ser aplicado con gotas oftálmicas que contengan esteroides con un intervalo de 5 minutos.

SOBREDOSIS

Por ingestión oral accidental no ofrece peligros ya que el contenido del frasco representa una pequeña fracción de la dosis oral diaria máxima para adultos.

TRATAMIENTO

-Tratamiento sintomático y de soporte. No existe antídoto específico.
-En caso de ingestión accidental beber grandes cantidades de líquido.

RESTRICCIONES DE USO

Hemofilia y/o defectos de la coagulación. Queratitis epitelial por herpes simple. Pacientes que presenten tiempo de sangría prolongado.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C. Una vez abierto el frasco utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Tel: 220-418.



Oftalmol
División de **INDUFAR CISA**
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Alvaro / Zaaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13