

Z-CAL REUMA FORTE

Piroxicam - Dexametasona - Vitamina B12

Orfenadrina

Comprimidos gastroprotegidos

Antirreumático - Antiinflamatorio

Relajante Muscular

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido gastroprotegido contiene:

Piroxicam.....	10 mg
Dexametasona.....	1 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	2500 mcg
Orfenadrina citrato	35 mg
Excipientes	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z-CAL REUMA FORTE asocia principios activos específicos para el tratamiento de los diferentes tipos de reumatismo, cualquiera sea su causa, en forma prolongada y con posología cómoda.

Las enfermedades reumáticas constituyen un complejo inflamatorio, neurítico y de contractura muscular. La asociación de dos antiinflamatorios (**Piroxicam** + **Dexametasona**) en la fórmula del Z-CAL REUMA FORTE, aporta una acción antiflogística potenciada para este tipo de patología. El agregado de **Vitamina B12** (Cianocobalamina) como antineurítico y de **Orfenadrina** como miorelajante completan la fórmula específica para el tratamiento de cuadros que cursan con estas sintomatologías.

INDICACIONES

Procesos inflamatorios del aparato locomotor: artritis reumatoidea, monoartritis, espondilartrosis, síndrome de hombro doloroso, cláticas, artrosis en todas sus formas, lumbociatalgias, gota crónica, reumatismo de partes blandas, miositis, neuritis, cervicobraquialgias, neuralgias, artritis.

POSOLOGÍA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente. Como posología de orientación se aconseja:

Adultos (incluyendo pacientes geriátricos): 1 comprimido de Z-CAL REUMA FORTE por día, preferentemente después de la cena. En casos de sintomatología intensa se puede empezar con 2 comprimidos como dosis inicial hasta remisión del cuadro y luego seguir con 1 comprimido.

Población Pediátrica: no está indicado para el tratamiento en la población pediátrica, ya que no se ha establecido su seguridad ni eficacia.

No se recomienda ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal y hepática leve. En pacientes con insuficiencia renal y hepática moderada a grave, la administración debe realizarse con precaución.

REACCIONES ADVERSAS

Molestias epigástricas, náuseas, constipación y diarrea. Además mareos, fatigas, sequedad bucal e insomnio.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal, gastritis, procesos infecciosos, embarazo, hipersensibilidad a algunos de sus componentes. No emplear en cuadros de herpes simple ocular, tuberculosis activa, insuficiencia renal, hipertensión arterial. Micosis sistémica.

INTERACCIONES

El uso concomitante con Alcohol genera un aumento de la biotransformación he-

pática de los fármacos, con lo que se deterioran sus actividades terapéuticas. El uso simultáneo con Cloranfenicol puede antagonizar la respuesta hematopoyética a la Cianocobalamina. Las fórmulas con Potosio de liberación prolongada pueden reducir la absorción de Cianocobalamina en el tracto gastrointestinal.

La **Dexametasona** aumenta el riesgo de hepatotoxicidad cuando se emplea simultáneamente con dosis elevadas de Paracetamol, además utilizada con glucósidos digitálicos aumenta la posibilidad de arritmias. No asociar el **Piroxicam** con Ácido Acetilsalicílico porque no existe sinergismo entre ellos y aumenta la posibilidad de reacciones adversas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe administrar con cuidado a pacientes con antecedentes de úlcera péptica o hemorragias digestivas, trastornos hematopoyéticos o de la coagulación, enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares, disfunción renal y hepática grave, el tratamiento prolongado puede causar disfunción suprarrenal, hiperglucemia, glucosuria. Alteraciones hidroelectrolíticas, micosis sistémica. No debe administrarse esquema de vacunación en pacientes que se encuentren en tratamiento con corticosteroides, exceptuando el tratamiento de reemplazo (enfermedad de Addison).

Embarazo y lactancia: En mujeres en etapa de lactancia con potencial para embarazarse el médico debe evaluar el riesgo-beneficio para la madre y el feto. Por su acción inhibitoria sobre prostaglandinas pueden llegar a controlar el trabajo de parto.

SOBREDOSIS

Dolor abdominal náuseas, vómitos, diarrea. Nerviosismo o inquietud. Respiración rápida. Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Convulsiones.

TRATAMIENTO

Vaciado del estómago mediante la inducción de emesis. Administración del carbón adsorbente. Vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales. Instauración del tratamiento sintomático y otras medidas de mantenimiento si es necesario. Para las convulsiones: Se recomienda administrar una Benzodiazepina tal como Diazepam (5 a 10 mg por vía intravenosa). Para la hipertensión: Administrar Fentolamina.

RESTRICCIONES DE USO

Úlcera péptica activa. Pacientes que han demostrado hipersensibilidad a los fármacos presentes en el medicamento. Disfunción renal o hepática severa, infecciones fúngicas sistémicas.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 10 comprimidos gastroprotegidos.

Caja conteniendo 20 comprimidos gastroprotegidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535