

Z VICK HEDERA HÉLIX

Jarabe 120 mL

Mucolítico - Broncoespasmodiático - Antitusivo

V.a.: Oral

FÓRMULA

Cada 5 mL contiene:

Extracto seco de Hedera Hélix.....35 mg

Excipientes: Metilparabeno 2,50 mg; Propilparabeno 0,30 mg; Sorbitol 70% 1500 mg; Glicerina anhidra 750 mg; Metabisulfito 5 mg.

Otros Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z VICK JARABE contiene en su formulación el **Hedera Hélix** cuyo efecto terapéutico, en enfermedades de las vías aéreas, se debe a las propiedades secretolíticas y espasmolíticas de las saponinas que contiene el extracto. El efecto secretolítico del extracto se debe esencialmente a la naturaleza de las saponinas, en tanto se considera que los efectos parasimpaticolíticos de ciertos glucósidos, contenidos en el extracto son la base de las propiedades espasmolíticas que se ejercen, particularmente, en los bronquios inflamados.

INDICACIONES

Z VICK está indicado para el tratamiento de enfermedades bronquiales inflamatorias agudas y crónicas, acompañadas de tos.

POSOLOGÍA

Según prescripción médica.

Niños de 2 a 5 años de edad: 2,5 mL de jarabe 3 veces al día.

Niños de 6 a 12 años de edad: 5 mL de jarabe 3 veces al día.

Adultos y niños mayores de 12 años de edad: 5 mL a 7,5 mL de jarabe 3 veces al día.

Este medicamento se administra por vía oral. Las dosis deben medirse con el vasito dosificador adjunto, para administrar la dosis exacta.

La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico; de todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana aún en el caso de inflamaciones menores del tracto respiratorio.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con antecedentes de alergia o hipersensibilidad a **Hedera Hélix**.

REACCIONES ADVERSAS

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, en individuos sensibles a algunos de sus componentes, podrían llegar a presentarse malestares gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) o reacciones alérgicas (urticarias, erupción, disnea). En casos raros puede tener un efecto laxante, debido al contenido de sorbitol presente en este producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El uso de medicamentos que contengan **Hedera Hélix**, en niños menores

de un año de edad puede causar vómitos y diarrea.

El uso concomitante con antitusígeno como la Codeína no se recomienda. Embarazo y lactancia: en caso de embarazo o período de lactancia, se debe consultar a un médico antes de ingerir este medicamento.

Por contener Metilparabeno y Propilparabeno como excipiente este medicamento puede causar urticaria. Generalmente puede producir reacciones retardadas como dermatitis de contacto. En raras ocasiones puede darse reacciones inmediatas, urticaria y broncoespasmo. Por contener 1,5 g Sorbitol al 70% y 0,005 g de Metabisulfito de Sodio como excipiente por cada 5 mL puede causar molestias estomacales y diarrea. No debe administrarse en pacientes con reacciones de tipo alérgico, incluyendo anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

Este medicamento por contener Glicerina Anhidra como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

INTERACCIONES

No se conocen efectos adversos en el caso de ingestión simultánea con otros medicamentos.

SOBREDOSIS

La sobredosis de Z VICK JARABE podría provocar náuseas, diarrea y agitación.

TRATAMIENTO

Puesto que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

RESTRICCIÓN DE USO

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco x 120 mL con vasito dosificador.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Libre en Farmacias

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gra. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

Importado por: **IMFAR S.R.L.**

Santa Cruz - Bolivia

Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-64814/2018

División de **INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535