

Ergo-Z-mol

Comprimidos Analgésico y Antiaquecoso

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido de ERGO-Z-MOL contiene:

Paracetamol.....	500 mg
Ergotamina Tartrato.....	1 mg
Cafeína.....	100 mg
Clorfeniramina maleato.....	1 mg
Excipiente.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ERGO-Z-MOL es un analgésico de notable actividad en los diferentes tipos de cefaleas, debido a la complementación de las acciones farmacológicas de sus componentes que controlan con efectividad estos frecuentes y desagradables cuadros dolorosos. Las jaquecas, las cefaleas de origen vascular, las cefaleas de origen inespecífico, son calmadas por ERGO-Z-MOL con rapidez y efectividad debido a la acción analgésica del **Paracetamol**; al efecto vasoactivo regulador que posee la **Ergotamina** sobre los fenómenos vasculares cerebrales desencadenantes del cuadro; a la acción de la **Cafeína** como sinergizante de la acción de **Ergotamina** y potenciadora de la acción analgésica del **Paracetamol**. La **Clorfeniramina** antagoniza la acción de la histamina, causante de muchos casos de "cefalea vascular" por provocar vasodilatación meníngea y cerebral. Además por su leve acción depresora del S.N.C., la **Clorfeniramina** contribuye disipando la excitación generada por estos cuadros dolorosos.

INDICACIONES

Jaquecas. Cefaleas de origen tensional. Cefaleas de origen vascular. Cefalea de Horton. Cefaleas de cualquier etiología.

POSOLOGÍA

En casos severos: 2 comprimidos en forma inicial y luego 1 comprimido cada media hora si es necesario, no excediendo de 6 comprimidos en 24 horas, o cada 4 a 6 horas.

En casos leves a moderados: 1 a 2 comprimidos en forma inicial y luego cada 4 a 6 horas, según necesidad.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse náuseas, vómitos (por irritación gastrointestinal), sudor frío, sequedad en boca o nariz, sofoco.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda suspender la administración si aparece pulso rápido, mareos o latidos cardíacos inusualmente.

Administrar con cuidado a pacientes que padecen asma bronquial avanzada así como aquellos de edad avanzada.

En caso de irritación gástrica puede tomarse con leche u otros alimentos.

CONTRAINDICACIONES

En dosis terapéuticas es un medicamento bien tolerado. No debe ser utilizado durante el embarazo y la lactancia. Administrarlo con precaución en pacientes con antecedentes digestivos, de úlcera péptica gastroduodenal o gastritis.

INTERACCIONES

El uso simultáneo de alcohol o medicamentos que producen depresión del SNC con **Clorfeniramina** puede potenciar los efectos depresores sobre el SNC de estos medicamentos o de los antihistamínicos. Con el uso de anticolinérgicos u otros medicamentos con acción anticolinérgica con **Clorfeniramina** se pueden potenciar los efectos anticolinérgicos.

El uso simultáneo de los IMAO con la **Clorfeniramina** puede prolongar e intensificar los efectos anticolinérgicos y depresores del SNC de los antihistamínicos. Los anticonceptivos orales pueden reducir el metabolismo de la **Cafeína**.

La administración de **Cafeína** con suplementos de Calcio, puede inhibir la absorción de Calcio.

Los vasoconstrictores sistémicos y otros alcaloides del cornezuelo de centeno en uso simultáneo con **Ergotamina** producen isquemia vascular periférica y gangrena, por lo que no se recomienda su administración.

SOBREDOSIS

Diarreas.

Dolor severo en piernas y brazos.

Taquicardia.

Mareos.

Dolor abdominal y gástrico.

Agitación, ansiedad.

TRATAMIENTO

El tratamiento para la sobredosis debe ser sintomático y de apoyo.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio en presencia de asma aguda, enfermedades metabólicas, predisposición a retención urinaria.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura no mayor a 25°C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 12 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535