

Z-mol

Paracetamol

Comprimidos 500 mg - 750 mg - 1 g

Analgésico y antifebril que no irrita la mucosa gástrica

Vía de Administración: Oral

FÓRMULAS

Cada comprimido de **Z-MOL 500 mg** contiene:

Paracetamol.....500 mg

Excipientes.....c.s.

Cada comprimido de **Z-MOL 750 mg** contiene:

Paracetamol.....750 mg

Excipientes.....c.s.

Cada comprimido de **Z-MOL 1 g** contiene:

Paracetamol.....1 g

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z-MOL contiene **Paracetamol**, un analgésico y antifebril que se caracteriza por no poseer acción irritante sobre la mucosa gástrica, no produciendo por lo tanto ardor de estómago.

INDICACIONES

Cuadros febriles cualquiera sea su origen. Cefaleas. Dolores musculares. Neuralgias. Dolores post-traumáticos y post-operatorios. Artralgias. Cuadros gripales.

POSOLOGÍA

Salvo otra indicación del médico, la dosis para adultos es:

Z-MOL comprimidos (500 mg):

1 a 2 comprimidos 3 a 4 veces al día, sin exceder de 8 comprimidos al día. En pacientes con hepatopatías tener cuidado con la dosis habitual.

Z-Mol 750 mg: 1 comprimido 3 a 4 veces al día, sin exceder un total de 5 comprimidos al día.

Z-Mol 1 g: 1/2 a 1 comprimido 3 a 4 veces al día, sin exceder de 4 comprimidos al día.

Dosis máxima: 4 g de **Paracetamol** por día.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con deficiencias hepáticas.

A dosis terapéuticas, **Z-Mol** no tiene otras contraindicaciones por ser muy bien tolerado y no presentar efectos tóxicos.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse agranulocitosis (dolor de garganta y fiebre inexplicable), dermatitis alérgica (rash cutáneo, urticaria o prurito), insuficiencia renal (disminución brusca de la cantidad de orina), con el uso prolongado de dosis elevadas en pacientes con disfunción renal e insuficiencia renal puede dar lugar a uremia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe cuidarse su uso en pacientes alérgicos a los Salicilatos ya que

puede producir reacciones alérgicas tipo broncoespasmo. **Z-MOL** se debe administrar con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción renal grave y hepática.

Además administrar con cuidado en pacientes tratados con inductores enzimáticos o con drogas consumidoras de glutatión. En alcohólicos no se deben sobrepasar los 2 g de **Paracetamol** por día.

INTERACCIONES

La asociación del **Paracetamol** con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos pero también tóxicos. Al administrar concomitantemente el **Paracetamol** con alcohol, inductores de enzimas hepáticas o medicamentos hepatotóxicos el riesgo de hepatotoxicidad aumenta. Con anticoagulantes derivados de la Cumarina, la administración simultánea crónica de dosis elevadas de **Paracetamol** puede aumentar el efecto anticoagulante.

SOBREDOSIS

- Aumento de la sudoración.
- Náuseas, vómitos.
- Calambres o dolor de estómago.
- Lesión hepática.
- Necrosis tubular renal que produce insuficiencia renal.

TRATAMIENTO

- Lavado gástrico.
- Administrar acetilcisteína por vía intravenosa.
- Controlar la función renal y hepática.
- Instaurar el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico.

RESTRICCIONES DE USO

Utilizar con precaución durante el embarazo y la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 20 comprimidos de 500 mg - Venta libre en farmacias.

Caja conteniendo 20 comprimidos de 750 mg. - Venta bajo receta.

Caja conteniendo 20 comprimidos de 1 g. - Venta bajo receta.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Paraguay:

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13