

# Z-lim Plus

## Jarabe

### Ambroxol - Oxolamina

Antiinflamatorio de las vías respiratorias

Antitusivo - Expectorante

Vía de administración: Oral

#### FÓRMULA

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Ambroxol HCl.....	15 mg
Oxolamina Fosfato.....	70 mg
Excipientes.....	c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z-lim Plus Jarabe contiene en su formulación **Ambroxol** y **Oxolamina** con potente acción antiinflamatoria de las vías respiratorias, antitusígena y expectorante. Actúa disminuyendo la adhesividad y viscosidad de las secreciones traqueo-bronquiales, aumentando la velocidad de eliminación de las secreciones respiratorias y optimizan la capacidad de expectoración del individuo. Como antiinflamatorio actúa sobre la mucosa de las vías respiratorias destruyendo la neuraminidasa.

#### INDICACIONES

Está indicado en las afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias con producción anormal de secreciones mucosas que se acompañan de tos, especialmente los que cursan con inflamación, tales como laringitis, reacciones laríngeas posoperatorias, traqueo-bronquitis, bronconeumonía, neumopatías febriles, asma, tos por aspiración de sustancias irritativas y en general.

#### POSOLOGÍA

**Adultos y niños mayores de 12 años:** 10 mL cada 6 a 8 horas.

**Niños de 6 a 12 años:** 5 mL cada 8 horas.

Menores de 6 años usar bajo cuidado estricto del pediatra.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Alteración de la motilidad ciliar, por ejemplo en los raros casos de síndrome ciliar maligno. No debe ser administrado a pacientes hipertensos, que estén cursando con enfermedad hepática, gastritis o úlceras pépticas, a pacientes en tratamientos con IMAO, antidepresivos tricíclicos o depresores del SNC. No administrar en el primer semestre del embarazo.

#### REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos se han producido náuseas, vómitos, acidez y molestias gastrointestinales. Pocas veces se han producido reacciones alérgicas. En raras ocasiones se ha reportado casos de somnolencia, sequedad de la boca, palpitaciones y mareos.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpir inmediatamente en caso de aparición de reacciones de hipersensibilidad. Tener en cuenta su asociación con estimulantes corticales que pudieran utilizarse concomitantemente tales como los beta adrenérgicos y efedrina. Usar con precaución en pacientes que usan anticoagulantes orales, en los cuales debe controlarse el tiempo de protrombina. Pacientes con insuficiencia renal o enfermedad hepática deberían reducir la dosis o aumentar el intervalo de administración. Utilizar con precaución en pacientes ulcerosos. Este medicamento contiene Sorbitol por lo cual se debe consultar con el médico si padece de intolerancia a ciertos azúcares.

#### INTERACCIONES

Potencia el efecto broncodilatador de los beta 2-adrenérgicos. La administración simultánea de **Ambroxol** con Amoxicilina o Eritromicina produce un aumento de la concentración de tales antibióticos en el moco y secreciones bronquiales. Se ha observado un aumento del tiempo de protrombina en algunos pacientes tratados con anticoagulantes cumarínicos, no así con el ácido acetil salicílico.

#### SOBREDOSIS

Náuseas, vómitos, dolores de estómago, broncoespasmo, hipotensión. En niños se han registrado casos de excitación, agitación y alucinaciones

#### TRATAMIENTO

**Reacciones de hipersensibilidad:** administrar antihistamínicos y corticoides sistémicos.

**Reacciones anafilácticas graves:** epinefrina parenteral, respiración asistida, tratamiento sintomático y de mantenimiento.

#### RESTRICCIONES DE USO

Administrar con cuidado en pacientes con hipersensibilidad a la Bromhexina por posibilidad de alergia cruzada. No usar en menores de un año de edad.

#### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C. Proteger de la luz.

#### PRESENTACIONES

Caja conteniendo frasco x 120 mL.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos .  
Teléfono: 220-418."



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13