

Calmante del dolor
Z-cal 1000
Analgésico
Gel

Diclofenac Dietilamina 2,32g/100g

Antiinflamatorio y Analgésico Percutáneo

Vía de Administración: Tópica

FÓRMULA

Cada 100 g de gel contiene:

Diclofenac Dietilamina (equiv. a Diclofenac sódico).....2,32 g

Excipientes: Propilenglicol 20,00 g., Otros Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio y analgésico percutáneo.

INDICACIONES

El Z-CAL 1000 GEL, está indicado para tratamiento tópico de: traumatismos cerrados, reumatismo muscular, periartritis escapulo-humeral, lumbago, ciática, bursitis, tenosinovitis, desgarros musculares, lesiones deportivas, dolores musculares varios.

POSOLOGÍA

Depende del área a ser tratada: Aplicar 2 a 4 gramos de Z-CAL 1000 GEL, de 3 a 4 veces al día, sobre la parte afectada, masajeando suavemente hasta la absorción completa del gel. **"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"**

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al **Diclofenac**. Pacientes en quienes el Ácido Acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroides desencadenen urticaria o rinitis aguda.

No aplicar sobre heridas, lesiones eczematosas, mucosas, ni quemaduras.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden aparecer rubefacción, rash o prurito, dermatitis (incluyendo dermatitis de contacto) erupción, eczemas, eritema, urticaria. Cuando se utiliza sobre amplias zonas por periodos prolongados, pueden darse la posibilidad de que aparezcan efectos sistémicos adversos. A veces pueden verse reacciones de fotosensibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Z-CAL 1000 GEL, debe aplicarse en superficies cutáneas sanas e intactas (ausencia de heridas o lesiones abiertas), evitando el contacto con los ojos y mucosas. Al ser administrado por

vía tópica son escasas las probabilidades de que se produzcan efectos secundarios sistémicos; sin embargo pueden observarse cuando la droga se aplica en zonas relativamente extensas de la piel y durante un periodo prolongado. No Utilizar simultáneamente en la misma zona con otras preparaciones tópicas. Evitar exponer al sol la zona tratada para reducir el riesgo de aparición de reacciones de fotosensibilidad.

INTERACCIONES

- El **Diclofenac** administrado de forma simultánea con preparados de Litio o Digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos.

- El **Diclofenac** puede inhibir el efecto de los diuréticos.

- La nefrotoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante efectos antiinflamatorios no esteroides de **Diclofenac** sobre las prostaglandinas renales.

SOBREDOSIS

Hinchazón, enrojecimiento, escozor, urticaria en la zona de aplicación.

TRATAMIENTO

Puede que no se disponga de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

RESTRICCIONES DE USO

En pacientes con sensibilidad al **Diclofenac**. Lesiones que presentan irritación. Heridas abiertas en la zona de aplicación.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo como x 35 g. de gel.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta libre en Farmacias

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución:
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13