

CECAN

Cefalexina 500 mg

Cápsulas 500 mg

Polvo Para Suspensión 500 mg/5 mL

Antibiótico Cefalosporínico
de Amplio Espectro

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada cápsula contiene:

Cefalexina (como monohidrato).....500 mg

Excipientes:.....c.s.

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Cefalexina (como monohidrato).....500 mg

Excipientes:.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CECAN contiene **Cefalexina**, un antibiótico cefalosporínico bactericida con eficaz acción contra gérmenes Gram (+) y Gram (-), de excelente absorción intestinal, de eliminación urinaria prevalente y penicilinas resistente, con buena penetración en los tejidos y líquidos orgánicos.

INDICACIONES

Infecciones estafilocócicas y estreptocócicas de piel: impétigo, forúnculos, ántrax, hidradenitis, panadizos.

Infecciones de las vías urinarias: cistitis, uretritis, pielonefritis.

En infecciones de vías respiratorias altas y bajas: amigdalitis, faringitis, traqueobronquitis, bronconeumonías, neumonías, otitis media y externa.

Enfermedades víricas eruptivas: sarampión, rubeola, varicela, Herpes zoster, parotiditis, estomatitis inflamatorias y exudativas.

En gineco-obstetricia: aborto séptico, anexitis, metritis.

POSOLOGÍA

Adultos: 1 a 2 cápsulas (5 a 10 mL de suspensión) cada 6 - 8 o 12 horas según criterio médico y el cuadro clínico del paciente, pudiendo administrarse hasta 4 a 6 gramos al día.

Niños: La dosis corriente recomendada para niños es de 25 - 50 mg/Kg de peso por día pudiendo pasar al doble (50 - 100 mg/Kg de peso por día) en infecciones graves. Esta dosis diaria deberá fraccionarse a criterio médico según tipo y la gravedad de la infección cada 6 - 8 o 12 horas.

En forma general la dosis de referencia de CECAN SUSPENSIÓN es de 2,5 a 5 mL de suspensión, administrados cada 6 - 8 o 12 horas

CONTRAINDICACIONES

Esta contraindicado en pacientes con alergia conocida a los antibióticos del grupo de las cefalosporinas.

REACCIONES ADVERSAS

Trastornos gastrointestinales: raramente náuseas, vómitos y colitis pseudomembranosa, más frecuentemente diarrea, dolor abdominal,

dispepsia, gastritis.

Otras reacciones adversas: mareos, cefalea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda cumplir el ciclo completo de tratamiento, especialmente en infecciones estreptococcicas.

Si se produce irritación gastrointestinal, se recomienda administrar con alimentos.

Puede presentarse a veces una reacción de hipersensibilidad cruzada con la penicilina.

INTERACCIONES

La **Cefalexina** al administrarse simultáneamente con el Alcohol puede producir la inhibición de la enzima acetaldéhid deshidrogenasa haciendo que se acumule acetaldéhid en la sangre.

La excreción renal de la **Cefalexina** se retrasa al administrar con Probenecid.

La **Cefalexina** tiende a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contengan estrógenos al administrarse concomitantemente.

SOBREDOSIS

Diarrea acuosa y grave, Fiebre, Calambres, dolor y distensión abdominal, Candidiasis oral, Enrojecimiento o hinchazón cutáneo, Disfunción renal.

TRATAMIENTO

Ya que no existe ningún antídoto específico, el tratamiento de la sobredosis de cefalosporinas debe ser sintomático y de apoyo.

Reposición de electrolitos y proteínas para la colitis pseudomembranosa asociada a antibióticos.

RESTRICCIONES DE USO

Debe administrarse con cautela a los pacientes con insuficiencias renales severas.

CONSERVACIÓN

Cápsulas: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

Suspensión: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C. Luego de preparada la suspensión puede mantenerse en la heladera durante 14 días. Pasado este tiempo debe desecharse la cantidad de suspensión no utilizada.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 12 cápsulas.

Caja conteniendo 16 cápsulas.

Caja conteniendo frasco con polvo para preparar 100 mL de suspensión.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

 **LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13