

Metamizol - Clorfeniramina Dextrometorfan

Antigripal - Antifebril Antihistamínico - Antitusivo

Comprimidos Recubiertos

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Metamizol	300 mg
Clorfeniramina Maleato	1 mg
Dextrometorfan Hbr	
Excipientes	

INDICACIONES

Restriado común que cursan con dolor, leve o moderado, fiebre, tos improductiva (tos irritativa, tos nerviosa). Rinitis alérgica, perenne y estacional. Rinorrea asociada con el restrío común.

POSOLOGÍA

Adultos (Incluido edad avanzada) y adolescentes a partir de 12 años:

1 comprimido cada 4 a 6 horas.

Población Pediátrica:

Los niños menores de 12 años no pueden tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS

Mareos, somnolencia, transtorno de la visión, sequedad de la boca, inquietud, dolor abdominal, hipotensión, diarrea, náuseas, aumento de las transaminasas. Depresión respiratoria.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a algún excipiente de la fórmula, Insuficiencia renal, hepática y respiratoria. Hipertiroidismo Enfermedad Cardíaca Severa. Hipertrofia Prostática

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30º C.

PRESENTACIÓN

Exhibidor contenido 60 blisters X 4 Comprimidos Recubiertos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm. Dr. Humberto Simón - Reg. № 535 División de INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13