



## Solución Spray

**Antiinflamatorio - Analgésico - Anestésico**

**Vía de administración: Tópica**

### FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:

Salicilato de Metilo.....	30,0 g
Mentol.....	7,0 g
Benzocaína.....	2 mg
Excipientes: Eucalipto 0,5 g; Alcanfor 2,0 g; Trementina 1,5 g;	
Otros Excipientes c.s.	

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

MENTO VICK Rub Sport Solución Spray es una asociación de **Salicilato de Metilo**, **Mentol** y **Benzocaína** que permiten tener acción analgésica, antiinflamatoria, rubefaciente y anestésica. Esta combinación con excipientes adecuados como el Eucalipto, Alcanfor y Trementina le dan el vehículo apropiado mejorando sus acciones terapéuticas, aliviando dolores musculares y articulares. Es ideal para deportistas antes de las competencias, además su utilidad en pacientes con trastornos reumáticos y traumáticos.

### INDICACIONES

MENTO VICK Rub Sport Solución Spray está indicado para el alivio local sintomático de afecciones dolorosas o inflamatorias de origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos, como contusiones, torceduras, esguinces, traumatismos (golpes) sin herida abierta, calambres musculares, torticolis, dolor de espalda. Para aplicación a nivel muscular en deportistas antes de las competencias.

### POSOLOGÍA

Uso exclusivamente tópico, sobre la piel íntegra.

Adultos y niños mayores de 7 años: Pulverizar presionando el pico atomizador una pequeña cantidad sobre la zona a tratar. En caso necesario friccionar la piel para mejorar la absorción de los principios activos. Para prolongar el efecto puede cubrirse la superficie con un pedazo de gaza o lienzo.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la formulación. No se recomienda el uso a pacientes alérgicos a los salicilatos, al ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroideos (como el Ibuprofeno).

### REACCIONES ADVERSAS

Eritema, prurito, sensación de irritación cutánea en el lugar de aplicación

y sensibilización alérgica local, estos síntomas desaparecen al suspender el tratamiento.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar el contacto con el medicamento con las mucosas (nariz, boca) y los ojos. No aplicar en zonas muy extensas de la piel, con vendajes apretados, ni aplicar calor en la zona donde se use. No aplicar en heridas abiertas o sobre la piel lesionada.

### INTERACCIONES

No se han reportado interacciones en el uso cutáneo a la dosis indicada ya que se alcanzan concentraciones sistémicas muy bajas. La aplicación en exceso o en forma crónica, especialmente si esta en tratamiento con warfarina podría aumentar el riesgo de sangrado. Este medicamento contiene **Salicilato de Metilo**, el cual podría interactuar con otros agentes queratolíticos, potenciando su efecto. La **Benzocaína** actúa como antagonista de la actividad antibacteriana de las sulfonamidas.

### SOBREDOSIS

Su aplicación prolongada y/o en áreas extensas puede provocar intoxicación por salicilatos (mareos, vómitos, zumbido de oídos, visión borrosa, somnolencia), en cuyo caso deberá suspenderse la medicación.

### TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental y/o según criterio médico: inducir al vómito, realizar lavado gástrico e instaurar tratamiento sistémico o de mantenimiento.

### RESTRICCIONES DE USO

La seguridad de uso no ha sido comprobada durante el embarazo y la lactancia. Su utilización en estas circunstancias debería producirse según criterio médico, valorando su beneficio/riesgo, ya que los componentes pueden absorberse sistemáticamente a través de la piel.

### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

### PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco pulverizador x 50 mL de solución.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta libre en farmacias

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13