

CC125 CARDIO

CONTRADOL

MASTICABLE

**Ácido
Acetilsalicílico 125 mg**

Comprimidos Masticables

V.a.: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido masticable contiene:

Ácido Acetil Salicílico.....125 mg
Excipientes.....C.S.

INDICACIONES

Profilaxis del infarto y reinfarcto de miocardio en pacientes con angina de pecho. Prevención de la oclusión del by-pass aorto-coronario y de la recurrencia de accidente cerebrovascular. POSOLOGÍA: La dosis recomendada como antiagregante plaquetario es de 160 mg a 375 mg diarios, en una o dos tomas.

Embarazo: antes del tercer trimestre evaluando relación riesgo beneficio.

Lactancia: no se recomienda su uso.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. En niños y adolescentes con enfermedad febril de origen vírico, úlcera gastroduodenal, asma y niños. Tercer trimestre del embarazo. Insuficiencia renal, cardíaca o hepática grave.

REACCIONES ADVERSAS

Úlcera gástrica, úlcera duodenal, hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos, Espasmo bronquial paroxístico, Disnea grave, Rinitis, Hipoprotrombinemia, Síndrome de Reye, Hepatitis, erupciones cutáneas, angioedema.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe ingerirse alcohol ya que incrementa los efectos adversos gastrointestinales, ni con medicamentos que aumentan el riesgo de hemorragias. No administrar después de una extracción dental o intervención quirúrgica. Administrar con precaución a ancianos con insuficiencia renal y a pacientes con antecedentes de úlcera gástrica, disfunción renal y hepática. No administrar como preventivo de las molestias por vacunación.

INTERACCIONES

Alcohol Etilico, Anticoagulantes orales, Ibuprofeno, antihipertensivos (β -bloqueantes), Cidospolina, Corticoides, Inhibidores (ECA) y antagonistas de los receptores de la Angiotensina II, selectivos de la recaptación de serotonina, Antidiabéticos, Interferon α , Trombolíticos y antiagregantes plaquetarios, Vancomicina, Cimetidina y Ranitidina.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 100 comprimidos masticables.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Libre en Farmacias

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13