

# MULTIZYME

## L- Cistina - Vitamina B6

### Comprimidos Recubiertos

Reconstituyente y Estimulante del cabello y las uñas

Vía de administración: Oral

#### FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

L-cistina.....500 mg  
Piridoxina HCL (vitamina B6).....50 mg  
Excipientes: Lactosa monohidrato 133,41 mg; Propilenglicol 1,78 mg; Color Amarillo FDC N°5 Lake 2,50 mg. Otros excipientes c.s.

#### INDICACIONES

Tratamiento coadyuvante de los trastornos faneiales (fragilidad de uñas y cabello).

Tratamiento coadyuvante de los trastornos de cicatrización de la córnea.

#### POSOLOGIA

Dosis usual recomendada: 4 comprimidos al día en dos tomas con las comidas, durante un mes.

Si al cabo de un mes de tratamiento no se observa mejoría, debe consultarse al médico.

**“Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran”.**

#### REACCIONES ADVERSAS

Frecuencia desconocida:

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** prurito, erupción cutánea, urticaria, fotosensibilidad, hipertrichosis, acné.

**Trastornos del sistema inmunitario:** reacciones de hipersensibilidad.

**Trastornos del sistema nervioso:** se han notificado neuropatías periféricas, principalmente de tipo sensorial, tras dosis elevadas y/o con un uso prolongado de la vitamina B6.

**Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, flatulencia, distensión abdominal, diarrea.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o excipientes presentes en la formulación. Cistinuria.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este medicamento no debe utilizarse durante períodos prolongados.

Hay que tener especial cuidado cuando se toman varios productos que contienen vitamina B6.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Además, puede producir reacciones alérgicas porque contiene Color Amarillo FDC N° 5 Lake. Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. Este medicamento no tiene ningún efecto, o es insignificante, sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

**Embarazo:**

No existen datos, o son limitados, sobre el uso en mujeres embarazadas. Los estudios en animales son insuficientes para concluir sobre la toxicidad para la reproducción. Este medicamento no se recomienda durante el embarazo.

**Lactancia:**

Como la vitamina B6 pasa a la leche materna y debido a las altas cantidades de piridoxina presentes en MULTIZYME, no se recomienda su uso durante la lactancia.

**INTERACCIONES**

No aplica.

**SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO**

Se han notificado neuropatías periféricas, principalmente de tipo sensorial, tras dosis elevadas y/o uso prolongado de vitamina B6.

El tratamiento debe ser sintomático.

**CONSERVACIÓN**

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)

**PRESENTACIÓN**

Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Libre en Farmacias

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. - Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por: **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13