



Dermafar Beb 

Crema

Vitamina A - Vitamina D3 -  cido B rico
 xido de Zinc

Contra las irritaciones de la piel, tratamiento de la dermatitis del pa al, picaz n, sarpullidos.

V a de administraci n: T pica

F RMULAS

Cada 100 g de crema contiene:

Vitamina A.....	600.000 U.I.
Vitamina D3.....	62.800 U.I.
�xido de Zinc.....	15 g
�cido b�rico.....	2 g
Excipientes.....	c.s.p

INDICACIONES

Tratamiento de la dermatitis del pa al, sarpullido. Tratamiento de cicatrizaci n en las grietas del pez n de las madres, quemaduras de primer grado,  lceras por dec bito, escaras, eccemas.

POSOLOG A

Limpiar cuidadosamente la zona afectada, aplicar una peque a porci n de la crema masajeando cuidadosamente 2 a 3 veces al d a, hasta la total remisi n de la sintomatolog a. De ser necesario cubrir con gasa esterilizada

REACCIONES ADVERSAS

Suspender la administraci n del medicamento en caso de presentarse rash cut neo ardor o eritema en la zona de aplicaci n. No debe ser aplicado en zonas cercanas a los ojos o mucosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Pueden presentarse en la zona de aplicaci n enrojecimiento, prurito, ardor, escozor, rash cut neo.

Debido a que existe una cierta reabsorci n transcut nea de la Vitamina A, los riesgos de efectos secundarios aumentan cuando la superficie de aplicaci n es extensa, se emplea vendaje oclusivo, la piel est  lesionada (particularmente quemada) o se trata de mucosas. Mantener fuera del alcance de los ni os.

Asegurarse de la asepsia de la zona tratada. Siendo la Vitamina A una sustancia oxidable, no utilizar antes o despu s de un antis ptico con propiedades oxidantes.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a los componentes de la formulaci n.

INTERACCIONES

La presente formulaci n no presenta interacciones significativas con otros f rmacos ya que la absorci n de sus principios activos a trav s de esta v a (t pica d rmica) es leve.

SOBREDOSIS

No se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

En caso de ingestión accidental: puede producir vómitos, náuseas, cólicos.

En caso de contacto con los ojos: puede producir una irritación menor

TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental, inducir el vómito, beber agua para diluir el producto.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua tibia, durante 15 a 20 minutos, hasta que no quede evidencia del producto en los ojos.

Consulte a su médico si la irritación persiste.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente 15 °C a 30 °C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo pomo con 35 g. de crema.

Caja conteniendo pomo con 50 g. de crema.

Todo medicamento debe conservarse
fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por: **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13