

TRI-NEURIN

Alprazolam

Comprimidos Ranurados Recubiertos 0,50 mg - 1 mg

Ansiolítico - Tranquilizante - Antidepresivo

Vía de Administración: Oral

FÓRMULAS

Cada comprimido ranurado recubierto de TRI-NEURIN 0,5 mg contiene:

Alprazolam.....0,50 mg

Excipientes.....c.s.

Cada comprimido ranurado recubierto de TRI-NEURIN 1 mg contiene:

Alprazolam.....1 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **Alprazolam** es un ansiolítico antidepresivo perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, sus efectos están mediados por el aumento de la actividad del ácido gamma aminobutírico (GABA) el mayor neurotransmisor inhibidor del cerebro.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de los estados de ansiedad asociado o no con depresión. Pánico, trastorno por estrés agudo y estrés traumático así como una actividad específica en crisis de angustia. Fobia social.

POSOLOGÍA

La dosis óptima debe individualizarse para cada paciente, usándose la menor dosis que controle los síntomas.

Adultos: 0,25 a 0,5 mg en tres tomas diarias hasta un máximo de 4 mg/día. En crisis de pánico puede ser necesario administrar hasta 6 mg diarios.

Anianos o pacientes debilitados: 0,25 mg en dos o tres tomas diarias. No debe ser utilizado en tratamientos prolongados de más de 4 semanas de duración, a no ser que exista una indicación médica precisa. La dosis debe aumentarse o disminuirse en forma gradual. Para minimizar los riesgos de dependencia deben considerarse tratamientos intermitentes.

REACCIONES ADVERSAS

Depresión, sedación, somnolencia, ataxia, alteración de la memoria, disartría, cefalea; estreñimiento, boca seca, fatiga, irritabilidad. Ocasionalmente pueden presentarse, estado confusional, desorientación, mareos, visión borrosa, trastornos gastrointestinales, incoordinación muscular. Estos efectos secundarios son generalmente observados al inicio de la terapia y usualmente desaparecen con la supresión o con el ajuste de la dosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe controlarse el tratamiento con Alprazolam en pacientes psicóticos no indicándose como primera elección. Debe cuidarse el uso en pacientes con depresión severa o tendencia al suicidio. Puede producir tolerancia, dependencia física y psíquica, insomnio de rebote y ansiedad; inducir a una amnesia anterógrada; producir reacciones psiquiátricas y paradójicas, sobre todo en niños y ancianos. No administrar a niños menores de 18 años. Utilizar dosis menores en ancianos y pacientes con insuficiencia respiratoria crónica por riesgo asociado de depresión respiratoria. **Embarazo:** Usado en la fase tardía del embarazo, o a altas dosis durante el parto, puede aparecer en el neonato hipotermia, hipotonia y depresión respiratoria moderada, pueden desarrollar dependencia física y síndrome de abstinencia.

Lactancia: A pesar de que los niveles de Benzodiazepinas excretados en la leche materna (incluyendo Alprazolam) son bajos, su uso está contraindicado en madres lactantes.

Efectos sobre la capacidad de conducir: Dependiendo de la dosis y de la sensibilidad individual, puede disminuir la atención, alterar la capacidad de reacción y la función muscular, producir somnolencia, amnesia o sedación, especialmente al inicio del tratamiento o después de un incremento de la dosis. No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya

utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las Benzodiazepinas. Embarazo, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria grave, síndrome de apnea del sueño. Paciente cuyo principal síntoma de depresión es el retardo psicomotor, que presenten depresión bipolar, pacientes con síntomas de psicosis o glaucoma de ángulo cerrado. Insuficiencia renal y/o hepática. Intoxicación aguda por alcohol u otros agentes activos sobre SNC.

INTERACCIONES

El **Alprazolam** produce efectos depresivos adicionales en el SNC cuando se coadministran con sustancias como barbitúricos, alcohol, psicotrópicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos. La Cimetidina y anticonceptivos orales disminuyen el clearance del **Alprazolam**.

La Imipramina y Desipramina aumentan sus concentraciones plasmáticas de equilibrio con el uso simultáneo del **Alprazolam**.

SOBREDOSIS

- Depresión respiratoria y reacciones paradójicas (manías, agitación, hiperactividad).
- Disfunción hepática.
- Aturdimiento o torpeza.
- Somnolencia.

TRATAMIENTO

- Si el paciente está consciente (y no hay riesgo de obnubilación, coma o convulsiones por la ingestión), debe inducirse emesis mecánicamente o con eméticos, además, se puede administrar carbón adsorbente, por vía oral.
- Si el paciente está inconsciente puede realizarse lavado gástrico.
- Debe monitorizarse la respiración, el pulso y la presión arterial.
- Si la presión está deprimida se debe aplicar oxígeno.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con miastenia grave, glaucoma de ángulo cerrado, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia hepática o renal.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 50 comprimidos ranurados recubiertos de TRI-NEURIN 0,50 mg.

Caja conteniendo 50 comprimidos ranurados recubiertos de TRI-NEURIN 1 mg.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta Simple Archivada



"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418"

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

 **LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535