

Z-CAL REUMA CREMA

Diclofenac - Salicilato de Metilo

Via de Administración: Tópica

Analgésico - Antiinflamatorio

FÓRMULA

Cada 100 g de Crema contiene:

Diclofenac Dietilamina.....	2,32 g
Salicilato de Metilo.....	13,00 g
Excipiente: Mentol.....	6,00 g
Otros Excipientes.....	c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z-CAL REUMA CREMA, contiene en su formulación el **Diclofenac** que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, que desempeñan una acción importante en la aparición de la inflamación, dolor, fiebre y en relación con la hialuronidasa producida por gérmenes y la agregación plaquetaria.

La Cantidad de **Diclofenac** absorbida por la piel es proporcional al tiempo de contacto y el área de aplicación, y depende de la dosis absorbida se metaboliza en el hígado y se fija 99% a las proteínas séricas (albúminas).

Se excreta 60% por orina en forma de metabolitos mientras que el resto se elimina por la bilis en las heces. El **Salicilato de Metilo** es un rubefaciente analgésico que coadyuva a los procesos inflamatorios y dolorosos de los músculos y articulaciones, estimulando el flujo sanguíneo de los capilares.

INDICACIONES

Z-CAL REUMA CREMA esta indicado en casos de dolores musculares producidos por desgarres y ejercicios. Dolores articulares y reumáticos, contusiones, esguince, tortícolis, calambres y traumatismos deportivos.

POSOLOGÍA

Se recomienda aplicar Z- CAL REUMA CREMA sobre la zona inflamada friccionando suavemente hasta su total absorción de 3 a 4 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con asma o con antecedentes de ataques de asma, rinitis o urticaria por aspirina o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo.

Hipersensibilidad al **Diclofenac**, al Ácido Salicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede producirse dermatitis de contacto no

alérgicas con signos y síntomas de ardor, picazón, enrojecimiento de la piel, hinchazón y erupción cutánea, que desaparecen al suspender la aplicación del medicamento.

PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS

Medicamento de uso externo únicamente, no ingerir. no aplicar en lugares de la piel donde existen cortes, heridas abiertas, erupciones o eczemas, ni en las mucosas. Evitar el contacto con los ojos si esto ocurre lavar con abundante agua, debe evitarse la exposición al sol por el riesgo de aparición de reacciones de fotosensibilidad.

INTERACCIONES

- Administrado en forma simultánea con preparados de litio o digoxina, puede elevar el nivel plasmático de estos.
- Puede disminuir o inhibir el efecto de los diuréticos.

SOBREDOSIS

Hinchazón, enrojecimiento, escozor en la zona de aplicación.

TRATAMIENTO

Puesto que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

RESTRICCIONES DE USO

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo pomos x 30 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta Libre en Farmacias

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13