

# GARTEM VENOTÓNICO

**Diosmina - Bromelina**  
**Antivaricoso - Antiinflamatorio**  
**Comprimidos Gastroprotegidos**  
**Vía de Administración: Oral**

## FÓRMULA

Cada comprimido gastroprotegido contiene:

Diosmina.....	200 mg
Bromelina.....	20.000 U.R.
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

La **Diosmina** es un bioflavonoide que actúa como venotónico y vasculoprotector produciendo una vasoconstricción con aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permeabilidad. La **Bromelina** es una enzima proteolítica extraída del tallo y fruto de la planta de la piña (Ananas comosus) que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a disminuir el edema, pesadez y dolor de las zonas afectadas por várices.

## INDICACIONES

Síndrome prevaricoso (piernas pesadas y dolorosas, edemas). Várices y varicosidades. Síndromes hemorroidales. Estados hemorrágicos ligados a fragilidad capilar: epistaxis, accidentes de la hipertensión, nefritis hematórica, hemorragias ginecológicas.

## POSOLOGÍA

Salvo indicación facultativa, la dosis de referencia es:

Insuficiencia venosa: 2 a 3 comprimidos gastroprotegidos por día.

Crisis hemorroidal: 4 a 6 comprimidos gastroprotegidos por día, hasta alivio de la crisis. En todos los casos administrar preferentemente lejos de las comidas.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a alguno de los componentes de la formulación. Primer trimestre del embarazo.

## REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos digestivos leves como náuseas, vómitos, diarrea y dispepsia (digestión difícil). Otras reacciones adversas menos frecuentes son dolor de cabeza, malestar, vértigo. En raras ocasiones se han descrito reacciones cutáneas como erupción, prurito, urticaria.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Por no existir datos sobre su pasaje a la leche materna, se desaconseja su utilización en mujeres en el período de lactancia.

No se tiene constancia de efecto nocivo en la especie humana. Se debe extremar la precaución del uso durante el embarazo, valorando adecuadamente el uso de éste medicamento durante el mismo. Consulte a su médico si está embarazada o tiene previsto estarlo.

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo N° 5 y N° 6, puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

## INTERACCIONES

Al administrar simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos disminuye la absorción de **Diosmina**.

No administrar con Aspirina, Clopidogrel o anticoagulantes como la Warfarina, pues aumenta el riesgo de sangrado.

Antiinflamatorios no esteroideos como Ibuprofeno y Naproxeno administrados con **Bromelina** pueden sumar su efecto antiinflamatorio.

La **Bromelina** puede incrementar la absorción de Amoxicilina y Tetraciclina.

### **SOBREDOSIS**

No existen reportes de accidentes por sobredosificación.

### **TRATAMIENTO**

En el caso de que sucediera una sobredosificación, deberá instituirse el tratamiento sintomático específico y vigilar los signos vitales.

### **RESTRICCIONES DE USO**

Embarazo y lactancia.

### **CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C.

### **PRESENTACIÓN**

Caja conteniendo 30 comprimidos gastroprotegidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

**"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

**INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)

P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)

Teléfonos: 682 510 al 13