

GARTEM HEMORROIDAL

Óxido de zinc 4 g - Extracto de hammamelis 5 g

Aceite de hígado de bacalao 4 g

Antihemorroidal

Crema

Vía de Administración: Tópica Rectal

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

| | |
|----------------------------------|------|
| Óxido de zinc..... | 4 g |
| Extracto de hammamelis..... | 5 g |
| Aceite de hígado de bacalao..... | 4 g |
| Excipiente:..... | c.s. |

INDICACIONES

Antihemorroidal. Hemorroides internas y externas, hemorroides sangrantes, fisuras anales, estados pos-operatorios, abrasiones y ulceraciones recto-anales, crisis hemorroidales. Estados ansiosos que cursen con prurito y manifestaciones relacionados con la región anal y perianal.

POSOLOGÍA

Previo lavado con agua tibia de la región anal, se colocará la crema, una cierta cantidad en el conducto rectal y, asimismo, si fuera necesario, en la región perianal, 2 a 3 veces al día y después de cada deposición, como terapia inicial; para la terapia de mantenimiento se puede reducir la dosificación a 1 – 2 aplicaciones diarias o solo después de cada deposición o salvo criterio médico

REACCIONES ADVERSAS

El uso inapropiado puede enmascarar o agravar infecciones bacterianas, parasitarias, micóticas o virales. El riesgo de efectos secundarios locales se incrementa al aumentar la dosis del producto y la duración del tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe administrarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. No se han reportado alteraciones en el proceso de reproducción y tampoco incremento en la incidencia de malformaciones, a pesar de suponerse que se administra a un gran número de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Uso exclusivamente para aplicación anal.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en casos de pacientes con historia de sensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES

No posee.

SOBREDOSIS y TRATAMIENTO

Ante la eventualidad de ingestión puede producir náuseas, vómitos o sequedad de boca, el tratamiento consiste en el vaciamiento gástrico mediante la inducción de la emesis o lavado de estómago

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

PRESENTACIONES

Caja conteniendo pomos x 20 g. + cánula aplicador

Caja conteniendo 100 pomos x 20 g. + cánula aplicador (Presentación hospitalaria)

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13