

# MENTO

## UNGÜENTO

### FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Alcanfor.....	10,50 g
Mentol.....	1,75 g
Aceite de eucalipto.....	0,70 g
Aceite de pino.....	0,70 g
Salicilato de metilo.....	0,70 g
Excipientes.....	c.s.

### Indicaciones

Está indicado para el alivio de la congestión nasal, del prurito causado por picaduras de insectos, dolor leve causado por golpes.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los componentes de la formulación. Hipersensibilidad a los salicilatos o a otros AINEs (antiinflamatorios no esteroideos). No debe aplicarse sobre heridas abiertas, mucosas o piel eczematosa. No usar durante el embarazo y la lactancia. No usar en menores de 12 años.

### Reacciones Adversas

Pueden presentarse enrojecimiento, prurito, ardor y rash cutáneo en el área de aplicación.

### Precauciones y Advertencias:

No aplicar en zonas cercanas a los ojos o mucosas. Debido a la presencia de Alcanfor en la formulación, este no debe usarse en lactantes. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene lanolina. Evitar el contacto con los ojos. No usar cantidad excesiva del producto. No ocluir. Se recomienda evitar la exposición al sol del área tratada. No aplicar por más de 7 días seguidos.

### Posología y Modo de Uso:

Frotar el ungüento sobre la piel o inhalar los vapores que se liberan al aplicarlo. Repetir cada 4 a 6 horas si es necesario. Tener en cuenta que es recomendable de 1 a 3 aplicaciones.

### Interacciones con medicamentos y alimentos:

Dado que el Salicilato de metilo puede absorberse por la piel, algunos efectos adversos asociados con la administración oral de aspirina o salicilato pueden ocurrir tras la administración tópica del producto, incluidas irritaciones, tinnitus, náuseas o vómitos, especialmente si se aplican cantidades excesivas del producto. Se ha descrito potenciación de anticoagulantes orales con el uso de ese tipo de producto.

### Sobredosis y tratamiento:

En caso de ingestión accidental se presentan vómitos, náuseas, cólicos. Tratamiento: Lavado gástrico. Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

### Conservación

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños

Venta Libre en Farmacias

En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418"



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por: **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13