

Odontol

Brackets

Fluoruro de sodio 0,02 g
Colutorio

Vía de Administración: Tópica Bucal

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Fluoruro de sodio.....	0,02 g
Excipientes:	
Xilitol.....	6000 mg
Extracto seco de manzanilla.....	500 mg
Esencia de menta piperita.....	80 mg
Otros excipientes.....	c.s.p.

V.a.: tópica bucal

INDICACIONES: está indicado en profilaxis de caries dental, tanto en niños como en adultos. remineralización del esmalte dental cuando la caries ya se ha producido. pacientes con riesgo aumentado de caries como ser: portadores de aparatos de ortodoncia, fijación de maxilares o prótesis parciales, ingesta de alimentos o medicamentos que disminuyen la secreción salival. desensibilizante de cuellos dentales descubiertos por retracción gingival, gingivitis, mal cepillado.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO: la dosis usual recomendada:

Niños mayores de 6 años y adultos: antes de acostarse y tras el cepillado de los dientes se efectuará un enjuague con 15 ml del producto (utilizar la tapa dosificadora del envase) durante 1 o 2 minutos, eliminando posteriormente. Úsese 1 vez al día o de acuerdo con las recomendaciones de su odontólogo.

CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

Niños menores de 6 años (por el riesgo de deglución del enjuague).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: para uso en niños de entre 6 y 12 años consultar con el odontólogo. no debe ser ingerido. durante el embarazo o en periodo de lactancia consulte con el médico antes de utilizar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS: la exposición al fluoruro de sodio puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito. la exposición repetida puede causar debilidad y espasmos musculares, temblores, convulsiones, coma e incluso la muerte. el fluoruro de sodio puede afectar los riñones.

INTERACCIONES: el hidróxido de aluminio puede disminuir la absorción y aumentar la excreción fecal del fluoruro. los iones de calcio pueden formar complejos con el fluoruro e inhibir su absorción.

Sobredosis: una exposición muy alta al fluoruro de sodio puede provocar el depósito de fluoruro en los huesos y los dientes, una afección llamada fluorosis. esto puede causar dolor, discapacidad y manchas en los dientes.

CONSERVACIÓN: mantener a temperatura ambiente (15 °c a 30 °c).

Venta Libre en Farmacias
Manténgase fuera del alcance de los niños

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".



División de INDUFAR CISA

Regente: Quím. Farm. Dr.
Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13