

# Odontol

## Plac

**ANTISÉPTICO GINGIVO – DENTARIO  
INHIBIDOR DE LA PLACA BACTERIANA  
Colutorio**

**Antiinflamatorio - Analgésico**

**Vía de Administración: Oral**

### **FÓRMULA:**

**Cada 100 mL contiene:**

Gluconato de Clorhexidina..... 0,12 g  
Excipientes..... c.s.p.

**V.a.:** Tópica Bucal.

### **INDICACIONES:**

Tratamiento coadyuvante en infecciones de la mucosa oral y en cuidados postoperatorios en odontología.

**POSOLOGIA Y MODO DE USO:** La dosis usual recomendada es: Adultos y niños mayores de 6 años: Realizar enjuagues bucales con 15 mL (utilizar la tapa dosificadora) de ODONTOL PLAC sin diluir, durante 1 minuto de 1 a 3 veces al día, después del cepillado y enjuague de la cavidad oral completamente con agua. Escupir, no tragar. No deberá utilizarse normalmente durante más de 5 días seguidos. Puede utilizarse durante más tiempo si se lo ha indicado su odontólogo.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al principio activo.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Sólo por vía bucal: se debe evitar el contacto con ojos y oídos u otros tejidos, con excepción de la mucosa oral. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. En caso de ulceraciones y exfoliación erosivo-descamativa de la mucosa oral, no deberá usarse el medicamento. El uso prolongado podría alterar la flora microbiana oral, lo cual se asocia con el riesgo de propagación de hongos y bacterias (candidiasis). Si los síntomas persisten transcurridos 5 días y/o se asocian con fiebre, deberán reconsiderarse medidas terapéuticas. Este producto no está destinado a ser tragado. Por lo tanto, solo debe usarse en pacientes que puedan enjuagarse la boca. Con la administración bucal puede producirse una coloración marrón amarillenta reversible de los dientes, las reconstrucciones dentarias y la superficie de la lengua. Estos síntomas pueden prevenirse si se reduce el consumo de té, café y vino tinto. Al comienzo del tratamiento puede producirse una sensación de ardor en la lengua.

**También puede ocurrir lo siguiente:** deterioro reversible del sentido del gusto o entumecimiento reversible de la lengua. Estos síntomas generalmente mejoran a lo largo del tratamiento.

### **Embarazo y Lactancia:**

No se dispone de datos sobre la utilización de Gluconato de Clorhexidina en mujeres embarazadas. Como medida de precaución, se recomienda evitar su uso durante el embarazo. Se desconoce si Gluconato de Clorhexidina/metabolitos se excretan en la leche materna. Como medida de precaución, se recomienda evitar su uso durante la lactancia. La influencia de ODONTOL PLAC sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

**REACCIONES ADVERSAS:** Poco frecuentes: coloración marrón amarillenta reversible de los dientes, las reconstrucciones dentarias y la superficie de la lengua. Raras: aumento de la formación de sarro, sangrado de las encías después de cepillarse los dientes (en caso de uso regular). Reacciones de hipersensibilidad. Muy raras: irritación de la mucosa bucal, cambios descamativos reversibles en la mucosa. reacciones alérgicas graves con síntomas como broncoespasmo, disnea, edema periorbitario, hipotensión y shock, incluida la anafilaxia después de la aplicación local de clorhexidina. Frecuencia no conocida: parotiditis, disgeusia, parestesia/hipoestesia de la lengua (sensación de ardor, deterioro del sentido del gusto o entumecimiento). Dermatitis alérgica de contacto.

**INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:** No se han realizado estudios de interacciones con otros medicamentos. El efecto de ODONTOL PLAC podría disminuir con materiales aniónicos (p.ej., laurilsulfato sódico) que normalmente están presentes en las pastas dentífricas tradicionales y otras preparaciones comúnmente usadas de forma local en la boca. No se deben consumir alimentos ni bebidas azucarados inmediatamente después de usar este medicamento, porque podría disminuir su efecto.

**CONSERVACIÓN:**

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

**INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista -  
Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13