

Oftalmol Lágrimas

Fosfato disódico - Fosfato monosódico

Polivinilpirrolidona - Cloruro de sodio

Solución Oftálmica Estéril

Humectante Ocular

Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Fosfato disódico anhidro.....	8,75 mg
Fosfato monosódico 2H2O.....	1,13 mg
Polivinilpirrolidona K30.....	15 mg
Cloruro de Sodio.....	4,2 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES

Irritación y resecaimiento de los ojos, déficit de producción de lágrimas. En todos aquellos estados que requieren refuerzo lagrimal (lentes de contacto, edad avanzada, polución ambiental).

POSOLOGÍA

En adultos y niños mayores de 12 años se recomienda instilar 1 a 3 gotas en cada ojo según necesidad.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

REACCIONES ADVERSAS

En casos aislados puede ocasionar irritación ocular por hipersensibilidad. Ocasionalmente visión borrosa, molestias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para prevenir la contaminación del producto, debe cuidarse de no tocar los párpados, pestañas y zonas anexas con el pico del frasco gotero.

Mantener el frasco gotero cuidadosamente cerrado.

Espaciar instilación 5-15 min de otros productos oftálmicos.

"Si luego de varios días del uso persistiera la irritación se recomienda consultar al oftalmólogo."

Embarazo y Lactancia: No se han llevado estudios específicos en embarazadas y madres lactantes, aunque el producto no se absorbe sistémicamente, se recomienda utilizarlo con precaución durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES

No presenta interacciones con fármacos y/o alimentos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental se presentan náuseas, cólicos.

TRATAMIENTO

- Lavado gástrico.

- Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Una vez abierto el frasco utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 15 mL de solución oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

Paraguay

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

Importado por: *IMFAR S.R.L.*

Santa Cruz - Bolivia

Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-35313/2019



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución:

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13