

# Oftalmol Tears

Nafazolina 0,12 mg/mL

Solución oftálmica estéril

Descongestivo y Lubricante Ocular

Vía de Administración: Oftálmica

## FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Nafazolina HCl.....0,12 mg

Excipientes: (Dextrano 70) 1 mg; (Hipromelosa 2910) 3 mg; Cloruro de Benzalconio 0,10 mg; Ácido Bórico 10 mg; Borato de Sodio 0,40 mg; Otros

Excipientes c.s.p.

**Lea atentamente este prospecto antes de empezar a utilizar este medicamento, ya que contiene información para usted.**

Información importante para usted. Oftalmol Tears, solución se denomina en este prospecto.

## Oftalmol Tears.

Utilice este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o como le indique su médico.

- Conserve este folleto. Puede que lo necesite de nuevo.
- Si es necesario, pida a su médico o farmacéutico más información y consejos.
- Si nota algún efecto secundario, informe a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto. **Véase la sección 4.**
- Deje de usar las gotas y póngase en contacto con su médico si, después de 24 horas, su estado empeora o no muestra ningún signo de mejora.

## Este folleto le informa:

1. ¿Qué es Oftalmol Tears y para qué sirve?.
2. Lo que hay que saber antes de usar Oftalmol Tears.
3. ¿Cómo utilizar el Oftalmol Tears?
4. Posibles efectos secundarios.
5. Almacenamiento del Oftalmol Tears.

### 1. ¿Qué es Oftalmol Tears y para qué sirve?

Este medicamento contiene el principio activo clorhidrato de nafazolina, que pertenece a la clase de fármacos que tratan localmente los vasos sanguíneos.

Una clase de fármacos que tienen un efecto vasoconstrictor local. Contrae los vasos sanguíneos de los ojos, lo que reduce su enrojecimiento e hinchazón.

**Oftalmol Tears** es una solución de gotas para los ojos. Se utiliza para aliviar el enrojecimiento y la irritación temporales de los ojos.

**Oftalmol Tears** comienza a actuar en pocos minutos y dura al menos 3 horas.

### Este producto es de uso temporal.

**Oftalmol Tears** está indicado para adultos y niños a partir de 12 años.

El clorhidrato de nafazolina, contenido en **Oftalmol Tears**, puede utilizarse a veces para fines distintos a los descritos en este folleto. Pida consejo a su médico, farmacéutico o farmacéutica u otro profesional sanitario si es necesario y siga siempre los consejos que le den.

### 2. Lo que hay que saber antes de utilizar Oftalmol Tears

#### No utilizar:

- Si es alérgico al clorhidrato de nafazolina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- Si tiene un aumento de la presión en el ojo (glaucoma).
- Si tiene glaucoma de ángulo cerrado (riesgo de glaucoma súbito)
- Si tiene daños en la córnea, la capa externa del ojo

- Si tiene inflamación del iris.

Este producto no debe usarse antes de una cirugía para extirpar parte del iris del ojo por glaucoma (iridectomía periférica) si el ojo del paciente es propenso a la obstrucción del ángulo cameral periférico.

### **Advertencias y precauciones**

Este producto es de uso temporal y no debe utilizarse durante más de 7 días consecutivos.

El uso prolongado o excesivo puede reducir la eficacia del clorhidrato de nafazolina o incluso empeorar el enrojecimiento.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar el colirio *Oftalmol Tears* si tiene una afección ocular caracterizada por un enrojecimiento persistente, dolor o visión borrosa.

### **Niños**

El *Oftalmol Tears* no está recomendado para niños menores de 12 años.

Deje de usar este medicamento y póngase en contacto con su médico si tiene dolor de ojos, cambios en la visión, sensibilidad a la luz, enrojecimiento o irritación persistente del ojo, o si la condición empeora después de 24 horas o no muestran signos de mejora.

### **Uso con lentes de contacto**

*Oftalmol Tears* contiene cloruro de benzalconio, que se sabe que mancha las lentes de contacto blandas. Quitar los lentes de contacto de sus ojos antes de aplicar estas gotas. Puedes volver a ponerte los lentes de contactos en los ojos durante unos 15 minutos después de la aplicación de las gotas.

No administrar a niños menores de 2 años de edad, ya que este medicamento contiene Boro y puede afectar a la fertilidad en el futuro.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en período de lactancia, si cree que está embarazada o si está planeando tener un bebé, pida consejo a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

Si experimenta visión borrosa, no conduzca ni maneje maquinaria hasta que su visión se haya normalizado.

Este medicamento puede afectar a su capacidad para conducir vehículos o para realizar tareas que requieran mucha concentración.

Es su responsabilidad evaluar si es capaz de realizar estas tareas durante el tratamiento con el medicamento. Los efectos del medicamento y los efectos secundarios se describen en otras secciones.

Lea el prospecto completo para obtener orientación. Hable con su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.

### **Información importante sobre los ingredientes de *Oftalmol Tears***

Este producto contiene cloruro de benzalconio, que puede causar irritación ocular en algunas personas. Si sabe que es sensible a esta sustancia, no utilice este producto.

## **3. ¿Cómo utilizar *Oftalmol Tears*?**

Utilice este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o como le indique su médico.

Este medicamento es de uso exclusivo para los ojos.

### **Instrucciones de uso:**

Adultos y niños mayores de 12 años:

- Lávese las manos antes de usarlo.
- Evite tocar la punta del frasco con cualquier superficie.
- Aplicar suavemente 1 ó 2 gotas en cada ojo 2 ó 3 veces al día.

Este producto es de uso temporal y no debe utilizarse más de 7 días consecutivos.

Deje de usar las gotas y consulte a un médico si después de 24 horas la condición empeora o no muestra ningún signo de mejora.

### **Otros medicamentos y *Oftalmol Tears***

Espere unos 15 minutos entre *Oftalmol Tears* y cualquier otro producto ocular.

En caso de que se esté utilizando crema oftálmica, aplique siempre la crema en último lugar.

Si utiliza más gotas oculares de las que debería

El uso excesivo puede aumentar el enrojecimiento de los ojos. Si esto ocurre, deje de usar *Oftalmol Tears*. Si el enrojecimiento persiste, consulte a un médico.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, este medicamento puede provocar efectos secundarios. Sin embargo, no todos los consiguen.

A veces, en raras ocasiones, puede notar una pequeña irritación, como un escozor, tras la aplicación de Oftalmol Tears, ligera visión borrosa o ligera dilatación de las pupilas. Estos son esperados y temporales efectos.

#### 5. Almacenamiento del Oftalmol Tears

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

La fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

No utilice este medicamento si la solución cambia de color o se vuelve turbia.

#### PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero x 10 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

#### Paraguay

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

Importado por:

IMFAR S.R.L.

Santa Cruz - Bolivia

Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-61104/2022



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

**INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)

P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)

Teléfonos: 682 510 al 13