



Solución Oral

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene: Vitamina B12 50 mcg; Vitamina B1 0,01 g; Glicerofosfato de Magnesio 1 g; Glicerofosfato de Sodio 2 g; Glicerofosfato de Potasio 1 g; Excipientes: Sorbitol al 70% 4000 mg; Glicerina anhidra 4000 mg; Alcohol etílico 1 mL; Metilparabeno 100 mg; Propilparabeno 20 mg; Sodio Benzoato 500 mg; Otros excipientes c.s.p.

Usos y Aplicaciones

Suplemento de vitaminas y minerales que colabora con el normal funcionamiento del sistema nervioso y neuromuscular.

Posología

10 mL 1 o 2 veces al día o según prescripción médica.

Reacciones adversas:

Son de incidencia muy rara: rash cutáneo, prurito o silibancias.

Precauciones y advertencias: No debe utilizarse en pacientes con reacciones de tipo alérgico, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

Memovital B12 contiene como excipiente 4000 mg de Sorbitol al 70% por cada 100 mL de solución oral, los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este suplemento. Además puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea por contener Glicerina anhidra. También contiene 0,789 g de Alcohol etílico, lo que puede ser causa de riesgo en niños.

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio por unidad de dosis; esto es, esencialmente "exento de sodio". Por contener Metilparabeno y Propilparabeno como excipientes este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). Por contener como excipiente Benzoato de sodio puede aumentar el riesgo de ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) en recién nacidos (hasta 4 semanas de edad). Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.

En caso de embarazo, lactancia o niños menores de 12 años, consultar a su médico antes de consumir este producto.

Contraindicaciones

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. Hiperfosfatemias. Enfermedades de Leber. No administrar en pacientes con hipersensibilidad al cobalto, debido a la presencia de vitamina B12 en la formulación.

Conservación

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C.)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL			
Porción.....10 mL	Cada 100 mL	Cantidad por porción	% de IDR
Valor energético	0	0	0
Carbohidratos	0	0	0
Proteínas	0	0	0
Grasas Totales	0	0	0
Grasas Saturadas	0	0	0
Fibra Alimentaria	0	0	0
Sodio	0,46 g	0,046 g	1,92
Vitamina B12	50 mcg	5 mcg	208,3
Vitamina B1	10 mg	1 mg	83,3

Magnesio	0,12 g	0,012 g	4,61
Potasio	0,26 g	0,026 g	0,74

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Libre

En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13