

Oftalmol A+T

Antazolina Fosfato - Tetrazolina HCl

Descongestivo

Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Antazolina Fosfato.....0,5 mg

Tetrazolina HCl.....0,4 mg

Excipientes.....C.S

INDICACIONES

Afecciones alérgico inflamatorias de la conjuntiva. Conjuntivitis flictenular. Conjuntivitis irritativas no infecciosas. Además, en casos de reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, secreción lagrimal excesiva y estenosis de conducto lagrimal.

POSOLÓGÍA

Adultos: Se instilarán 1 ó 2 gotas en cada ojo afectado 3 ó 4 veces al día, o cada 3 o 4 horas, según la intensidad de los síntomas. La duración del tratamiento no debe ser superior a 3-5 días (podría producirse congestión de rebote). Si los síntomas no se resuelven en este período de tiempo, se debe evaluar la situación clínica y controlar la persistencia de condiciones oculares subyacentes.

Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños.

CONTRAINDICACIONES

Personas con Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o a otros componentes del producto. Embarazo. Lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede producir escozor leve y transitorio inmediatamente después de la instilación del colirio. Puede producirse una hiperemia reactiva tras suspender el producto. En raros casos pueden aparecer cefaleas, somnolencia y taquicardia, sobre todo en niños pequeños, así como sudoración, temblor, elevación de la presión arterial, estimulación central y síntomas anginosos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En pacientes con alergia recurrente crónica se deben elegir otras medidas terapéuticas u otros medicamentos. No está previsto el uso de este producto a largo plazo. Hay que tener precaución en los pacientes con rinitis seca. Debido a los efectos simpaticomiméticos generales, se debe tener cuidado al utilizar el producto en pacientes con diabetes o con cardiopatía grave, hipertensión, hipertiroidismo o feocromocitoma. Las infecciones oculares pueden verse enmascaradas. Para usuarios de lentes de contacto: Antes de aplicar el producto se deben quitar los lentes de contacto, y no se volverán a colocar al menos hasta 15 minutos después de la aplicación.

Pacientes de edad avanzada: Se recomienda precaución en mayores de 65 años, en particular los que padezcan enfermedades cardiovasculares graves, como arritmias e hipertensión, ya que la absorción del principio activo puede exacerbar estas condiciones.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria, que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.

INTERACCIONES

Debido a que OFTALMOL A+T contiene dentro de su formulación Tetrazolina, no deben emplearse en pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) hasta diez días después de concluir el tratamiento. Se produce un aumento de la tensión arterial con el uso concomitante con IMAO y antidepresivos tricíclicos.

SOBREDOSIS

No existe información disponible en cuanto a la sobredosis en humanos.

RESTRICCIÓN DE USO

Embarazo. Lactancia. Niños menores de 2 años.

TRATAMIENTO

El tratamiento en una sobredosis accidental oral incluye terapia de soporte y sintomática.

Se deben mantener despejadas las vías respiratorias. Ingerir abundante líquido.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

Paraguay

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13