

Ferrocál

Hierro elemental 30 mg/mL

Solución Gotas Orales

Ferroterápico - Antianémico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Hierro Elemental (como Sulfato Ferroso).....30 mg

Excipientes: Propilenglicol 120 mg; Sorbitol 648,60 mg; Otros Excipientes c.s.

1 mL = 24 gotas

INDICACIONES

Tratamiento de estados carenciales de hierro y Profilaxis de las anemias ferropénica o ferropriva. Complemento de la dieta del lactante.

POSOLOGÍA

Mujeres embarazadas: 30mg al día (30 gotas). **Mujeres en periodo de lactancia:** 15mg al día (15 gotas). **Dosis en niños de 4 a 10 años:** 10mg al día (10 gotas). **Dosis en niños de 1 a 3 años:** 6 a 10mg al día (6 a 10 gotas). **Recién nacidos de término:** 1 mg (1 gota)/kg/día desde los 4 meses de edad. **Recién nacidos de pre-término:** 2 mg (2 gotas)/kg/día desde los 2 meses o al doblar su peso inicial. D.M.D.: 15 mg/día. **Tratamiento curativo:** 3-5 mg/kg/día hasta 1 mes después de normalizada la hemoglobina y ausencia de signos de hipocromía.

Se recomienda tomar el medicamento con el estómago vacío, con agua o con jugo de frutas, cerca de 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

Este medicamento se debe usar durante el tiempo que el médico lo indique, respetando los horarios y la dosis, ya que si se utiliza por más tiempo que el recomendado o en dosis altas se pueden presentar efectos adversos severos.

“Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran”.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al hierro. En pacientes con alteraciones del tracto gastrointestinal como ulcera péptica o colitis ulcerativa. Pacientes con sobrecarga de hierro (hemocromatosis, hemosiderosis).

REACCIONES ADVERSAS

Dolores o calambres en el abdomen o estómago. Diarreas que a veces contienen sangre; vómitos y somnolencia. Irritación por contacto en el tubo digestivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe cuidarse su uso en pacientes con sensibilidad al **Hierro**. Así como aquellos que presenten hemocromatosis, hemosiderosis u otros estados anémicos. No se recomienda el uso simultáneo con tetraciclinas orales, dimercaprol, cimetidina y ciprofloxacina.

Este medicamento por contener 0,65 g de Sorbitol como excipiente por mL. Puede causar molestias de estómago y diarrea. Los preparados de hierro pueden provocar intoxicaciones sobre todo en niños. Se debe tener especial precaución si está tomando otro aporte complementario de hierro en la dieta y/o sales de hierro.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Es nula o insignificante.

INTERACCIONES

El **Hierro** cuando se usa simultáneamente con ácido acetohidroxámico es quelado dando lugar a una reducción de la absorción intestinal de ambos.

Con alcohol puede dar lugar a toxicidad ya que la absorción y el almacenamiento hepático de **Hierro** aumentan.

El café, huevos, leche, pan o cereales disminuyen la absorción de **Hierro** debido a la formación de complejos menos solubles o insolubles.

Las tetraciclinas orales reducen la absorción y los efectos terapéuticos del **Hierro**. Además la penicilamina y antiácidos disminuyen la absorción de **Hierro**.

SOBREDOSIS

La sobredosis puede ser mortal especialmente en niños pequeños. La erosión del estómago y del intestino es desencadenada luego de la absorción sistémica, crisis convulsivas, latidos cardíacos rápidos y acidosis metabólica.

TRATAMIENTO

Inducir la emesis, lavado con bicarbonato sódico. Corregir la acidosis con bicarbonato sódico intravenoso.

Antídoto: La deferoxamina administrada lentamente.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

RESTRICCIONES DE USO

No posee.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero de 15 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

Paraguay: "En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".

Importado por:

IMFAR S.R.L.

Santa Cruz - Bolivia

Teléf. 362-6640

Reg.: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matríc. N°: L-165

Reg. N°: II-35180/2018



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13